

Skjema for strukturert ammeobservasjon

En ammeobservasjon innebærer kartlegging av mange elementer, som for eksempel mors amnestilling, posisjonering av barnet, barnets dietak, sugelatferd og en generell observasjon både av mor og barn. Dette skjemaet kan være til hjelp for å strukturere og huske på alt du skal observere – særlig i starten.

Husk:

- Vurdering av barnets vekt og observasjon av barnets tonus og bevegelsesmønster bør alltid inngå.
- Kartlegg diemønster (ammehyppighet og lengde).
- Observer bryst og brystknopper; er det tegn til sår eller inflammasjon?
- For å avdekke hvor i prosessen det oppstår utfordringer og hva du må veilede på, bør du observere hele ammingen, fra mor legger barnet til brystet til måltidets slutt.
- Avdekker du utfordringer med dårlig amnestilling, dietak eller posisjonering av barnet må du veilede mor i hvordan hun kan endre dette.

Ammestilling	Kommentarer
Mor sitter godt og avslappet, og i en stilling som gjør at barnet kan ligge tett inntil mor.	
Barnet holdes/støttes med hode og kropp i en tilnærmet rett linje.	
Mor holder og støtter barnet på en slik måte at barnet selv kan finne brystet (som for eksempel ved tilbaketilbaket amming). Dersom mor støtter eller former brystet: • Støtt/form brystet med hånden, med fingrene i god avstand fra areola. • Form brystet samme vei som barnets munn.	
Barnets posisjon	Kommentarer
Barnet ligger tett inntil mor, med magen vendt inn mot mors kropp.	
Barnet har mulighet til å vippe hodet bakover når det skal gape over brystet.	
Barnet ligger slik at mors brystknopp peker mot barnets nese.	

Barnets søkereflekser aktiveres slik at det gaper stort.	
Mor trekker barnet mot seg, med barnets hode bøyd litt bakover, slik at barnets hake "leder vei" mot brystet.	
Barnet treffer brystet med underleppen godt under brystknopp.	
Optimalt dietak	Kommentarer
Barnet har stort gap, en vinkel på mer enn 120 grader i munnviken, og det har mye brystvev i munnen (ikke bare brystknopp).	
Barnets kinn er runde, uten smilehull.	
Barnets hake, og i noen grad kinn, er i god kontakt med mors bryst.	
Barnets nese er fri.	
Barnet har et asymmetrisk dietak, det vil si at det ses mer av areola (dersom den er synlig) på oversiden enn undersiden av brystet.	
Barnet er rolig, tilfreds og beholder brystet i munnen (opprettholder vakuum).	
Mor har ingen smerter under amming.	
Melkeoverføring	Kommentarer
Barnet suger raskt i begynnelsen av måltidet for å sette i gang utdrivningsrefleksen. Deretter skal det være tegn til god melkeoverføring. Tegn på effektiv melkeoverføring: • dypere dietak med svelging (det kan være pauser og hurtigere dietak før ny utdrivning kommer) • synlig og hørbar svelging • mors bryst er mykere etter ammingen	