

Livmorhalskreft diagnoseveileder

1 Mistanke om kreft

Mistanke om livmorhalskreft oppstår ved følgende symptomer:

- Blødningsforstyrrelser
- Blødning etter samleie
- Underlivssmerter og/eller blodig utflod
- Synlige suspekterte forandringer på livmorhalsen

2 Filterfunksjon

Filterfunksjon: Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling, unntaksvis fastlege eller annen lege.

Gynekologisk undersøkelse, eventuelt mikroskopi (kolposkopi) med vevsprøvetaking av livmorhals.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om livmorhalskreft oppstår når det ved gynekologisk undersøkelse er:

- Påvist / mistenkt livmorhalskreft i vevsprøve fra livmorhals
- Synlig og/eller palpabel svulst på livmorhalsen

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved **begrunnet mistanke** henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorhalskreft. Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

I tillegg skal henvisningen inneholde viktig informasjon, som f.eks:

- medikamenter
- komorbiditet
- skrøpelighetsvurdering (eks. [frailty score](#))

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for livmorhalskreft».

Henvisningen sendes offentlig sykehus.

5 Kommunikasjon

Ved begrunnet mistanke om livmorhalskreft informeres pasienten om:

- Den begrunnede mistanken om kreft
- Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Langvarig infeksjon med onkogen type av humant papillomavirus (HPV) er en nødvendig forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.

Se også [Pakkeforløp for livmorhalskreft](#).