

Lungekreft diagnoseveileder

1 Mistanke om kreft

Det er ingen symptomer som entydig peker mot lungekreft, men symptomer som hemoptyse samt nyoppståtte eller endrede symptomer fra lungene som vedvarer utover det som er vanlig ved for eksempel infeksjoner, bør gir mistanke om lungekreft og skal lede til rekvirering av CT toraks (ev. røntgen toraks front og side).

2 Filterfunksjon

CT toraks (ev. røntgen toraks front og side) tas uten opphold ved klinisk mistanke om lungekreft, selv om ev. rtg toraks er normalt.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Kriterier for henvisning til pakkeforløp er begrunnet mistanke om lungekreft som utløses av at enten radiologi viser malignitetssuspekt forandring i lunge, eller en biopsi tatt fra annet organ viser kreft som tyder på origo i lunge.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved **begrunnet mistanke** henvises pasienten til Pakkeforløp for lungekreft.

Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

I tillegg skal henvisningen inneholde viktig informasjon, som f.eks:

- medikamenter
- komorbiditet
- skrøpelighetsvurdering (eks. [frailty score](#))

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for lungekreft».

Henvisningen sendes lokalsykehuset eller nærmeste sykehus med lungemedisinsk kompetanse.

5 Kommunikasjon

Fastlege, eller annen henvisende instans, skal ved henvisning til Pakkeforløp for lungekreft informere pasienten om:

- Den begrunnede mistanken om lungekreft
- Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Røykere og tidligere røykere i aldersgruppen over 40 år

- Personer utsatt for eksponering av radongass over tid, spesielt i kombinasjon med røyking.

-Personer som i yrkessammenheng har vært utsatt for asbest, arsenikk, krom og nikkel, ioniserende stråling og/eller polysykliske aromatiske hydrokarboner.