

Livmorkreft diagnoseveileder

1 Mistanke om kreft

Mistanke om livmorkreft oppstår ved:

- Vaginalblødning etter overgangsalder
- Tilhører pasienten noen av risikogruppene, kan unormal blødning før overgangsalder gi grunnlag for undersøkelse

2 Filterfunksjon

Fastlege eller andre som har mistanke om livmorkreft henviser til gynekolog/gynekologisk avdeling for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke om livmorkreft.

Gynekologisk avdeling/gynekolog gjør følgende undersøkelser:

- Gynekologisk undersøkelse med ultralyd av livmor
- Vevsprøve fra livmorslimhinne og eventuelt mistenkelige områder på livmorhals og vagina
- Samlet klinisk vurdering av gynekolog

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Påvist forstadier til livmorkreft og billeddiagnostisk mistanke om tumor, eller påvist livmorkreft i vevsprøve gir begrunnet mistanke og pasienten henvises til Pakkeforløp for livmorkreft.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved **begrunnet mistanke** henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorkreft. Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

I tillegg skal henvisningen inneholde viktig informasjon, som f.eks:

- medikamenter
- komorbiditet
- skrøpelighetsvurdering (eks. [frailty score](#))

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for livmorkreft».

Henvisningen sendes offentlig sykehus.

5 Kommunikasjon

Ved begrunnet mistanke om livmorkreft informeres pasienten om:

- Den begrunnede mistanken om kreft
- Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Risikofaktorer og risikogrupper for livmorkreft er:

- Høy alder
- Overvekt
- Økt ensidig østrogenpåvirkning på livmorslimhinnen (PCO, Tamoxifenbehandling, anovulasjon, nullipara)
- Høyt blodtrykk
- Diabetes
- Lav paritet
- Polycystisk overiesyndrom
- Østrogenproduserende svulster
- Antiøstrogen-behandling etter overgangsalder (Tamoxifen)
- Genetikk (Lynch syndrom)

Se også Pakkeforløp for livmorkreft.