

**Tabell 7 Alvorlighetsgrad per type giverkomplikasjon**

<b>Kategori</b>	<b>Grad 1a (ubetydelig)</b>	<b>Grad 1b (moderat)</b>	<b>Grad 2 (alvorlig)</b>
<b>Lokale reaksjoner:</b>			
<b>1. Hematom, arteriell punksjon med symptomer og forsinket blødning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalisert</li> <li>• Symptomer &lt;1 uke</li> <li>• Ikke behov for lege annen enn blodbanklege</li> <li>• Kun lokal behandling (Hirudoid)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Større omfang enn kun til innstikkstedet</li> <li>• Behov for lege annen enn blodbanklege</li> <li>• Symptomer &lt;2 uker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sykehusinnleggelse</li> <li>• Alvorlige sekvele</li> <li>• Behov for kirurgi</li> <li>• Symptomer &gt; 2 uker</li> </ul>
<b>2. Nerveirritasjon og smerter i armen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptomer &lt;1 uke</li> <li>• Ikke behov for lege annen enn blodbanklege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behov for lege annen enn blodbanklege</li> <li>• Symptomer &lt;2 uker</li> <li>• Behov for sykemelding &lt; 1 uke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behov for henvisning til nevrolog</li> <li>• Alvorlige sekvele</li> <li>• Behov for kirurgi</li> <li>• Symptomer &gt; 2 uker</li> <li>• Behov for sykemelding &gt; 1 uke</li> <li>• Arbeidsuførhet</li> </ul>
<b>3. Tromboflebitt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptomer &lt;1 uke</li> <li>• Ikke behov for lege annen enn blodbanklege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptomer &lt;2 uker</li> <li>• Behov for lege annen enn blodbanklege</li> <li>• Behov for antibiotika p.o</li> <li>• Behov for sykemelding &lt; 1 uke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sykehusinnleggelse</li> <li>• Behov for antibiotika IV</li> <li>• Symptomer &gt; 2 uker</li> <li>• Behov for sykemelding &gt; 1 uke</li> </ul>
<b>4. Andre lokale komplikasjoner: DVT, AV-fistula, kompartimentsyndrom, pseudoaneurisme.</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sykehusinnleggelse</li> <li>• Behandling med antikoagulantia</li> <li>• Behov for kirurgi</li> <li>• Behov for sykemelding &gt; 1 uke</li> <li>• Arbeidsuførhet</li> </ul>
<b>Systemiske komplikasjoner:</b>			
<b>1. VVR uten synkope</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milde symptomer &lt;24 t</li> <li>• Moderate symptomer &lt;15 min</li> <li>• Ikke behov for lege annen enn blodbanklege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milde symptomer &gt;24 t</li> <li>• Moderate symptomer &gt;15 min</li> <li>• Behov for lege annen enn blodbanklege</li> <li>• Observasjon på sykehus (&lt; 24 timer), med behov for kun IV væske.</li> <li>• Behov for sykemelding &lt; 1 uke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sykehusinnleggelse (&gt; 24 t)</li> <li>• Symptomer &gt; 2 uker</li> <li>• Behov for vassopressor behandling</li> <li>• Behov for sykemelding &gt; 1 uke</li> </ul>