

Pasientskader i Norge 2020

Målt med Global Trigger Tool

Publisert i digitalt format

September 2021



Innhold

Forord	3
Sammendrag	4
1 Bakgrunn	5
2 Metode	6
3 Datagrunnlaget	8
4 Hvordan analyseres tallene	10
5 Resultater 2020	12
6 Om resultatene	18
7 Utviklingsmuligheter	20
Referanser	22
Vedlegg 1 Skadetyper	24
Vedlegg 2 Kontrollgrafer helseforetak og private sykehus	26
Vedlegg 3 Detaljert beskrivelse av beregninger	44
Vedlegg 4 Antall sykehousopphold det er trukket fra	45

Forord

Siden 2010 har andel sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge målt med GTT-metoden, blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen.

Denne rapporten presenterer resultatene av GTT-undersøkelsen for 2020 og analyserer trenden i omfanget av pasientskader fra 2012 til 2020.

2020 var et spesielt år, sterkt preget av covid-19-pandemien. Vi retter derfor en stor takk til alle GTT-teamene og deres støttespillere for gjennomføring av journalgjennomgang i en krevende periode.

Rapporten er utarbeidet av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Norsk Regnesentral er ansvarlig for statistiske analyser.

Oslo, september 2021

Bjørn Guldvog
helsedirektør

Johnny Advocaat-Vedvik
avdelingsdirektør
avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Sammendrag

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For somatiske sykehus måles dette med metoden Global Trigger Tool (GTT).

I 2020 oppstod det en pasientskade ved 13,1 % av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 12,4 % året før. Selv om resultatet for 2019 og 2020 er noe høyere enn i 2018, som var den laveste målingen siden 2012, ser vi en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader for alle alvorligetsgrader samlet i perioden 2012 til 2020.

I perioden 2012 til 2020 har det vært en statistisk signifikant nedgang på 59 % i skader som bidro til at pasienten døde. Det har vært en svak nedgang i omfanget av skader som var langvarig eller ga varig mén og skader som krevde livreddende behandling. Omfanget av lettere skader, som var forbigående og som kun krevde behandling, har hatt en statistisk signifikant nedgang og omfanget av forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold har hatt en svak økning. Det har også vært ulik grad av nedgang i pasientskader for de individuelle alvorligetsgradene fra 2012 til 2020, med unntak av skader som var forbigående, men som førte til forlenget sykehusopphold.

I 2020 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelatert skade, urinveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon og annen kirurgisk komplikasjon. Samtidig viser en samlet oppstelling av skadetyper knyttet til kirurgi, at disse forekommer i 4,8 % av alle sykehusopphold. Det er derfor god grunn til å konkludere med at helseforetakene og sykehusene bør sette fokus på skadene som oppstår ved kirurgi, og vurdere om det finnes forbedringspotensialer.

Det er ikke gjennomført analyser for måloppnåelse for det enkelte helseforetak, sykehus eller fagområde. Vi kan imidlertid se at det er relativt stor variasjon mellom helseforetakene i utviklingen over tid av andel sykehusopphold med minst én skade.

GTT-undersøkelsen baserer seg på tidsserier som skal fortolkes kvalitativt i det enkelte helseforetak. I dag gjennomføres undersøkelsen uten innhenting av bakgrunnsinformasjon. Det er derfor ikke mulig å analysere årsakssammenhenger ytterligere. Helsedirektoratet har etablert et prosjekt for å videreutvikle GTT-metoden slik at den kan brukes som nasjonal kvalitetsindikator for pasientskade. Prosjektet skal gi bedre forståelse av pasientskader i norske sykehus, hvorfor skadene oppstår, hvilke konsekvenser skadene har og om de kunne vært unngått eller ikke.

Ettersom det ikke samles inn noe bakgrunnsinformasjon, hverken om innleggelsene der det har oppstått skade eller innleggelsene der det ikke har oppstått skade, er det svært vanskelig å analysere hvordan covid-19 har påvirket omfanget av pasientskader i 2020. Ser vi på resultatene for det enkelte helseforetak/sykehus/medisinskfaglige område i kontrollgrafene opp mot belastningen i form av andel innlagte pasienter med covid-19, er det ingen tydelige mønstre å se.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har beregnet at pasientskader bidrar til ca. 15 % av de totale sykehuskostnadene i OECD-land. I Sverige har man beregnet at mer enn halvparten av pasientskadene som oppstår ved somatiske sykehus kunne vært forebygget. GTT-undersøkelsen i Norge skiller ikke på om pasientskaden kunne vært forebygget eller ikke, men det er ingen grunn til å tro at andelen forebyggbare skader er annerledes her enn i andre land. Dette innebærer at sykehusopphold med skade sannsynligvis er forbundet med betydelige ekstrakostnader også for norske helseforetak.

1 Bakgrunn

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 [1] har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For somatiske sykehus måles dette med metoden Global Trigger Tool (GTT).

Alle helseforetak og fem private sykehus har kartlagt pasientskader ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT-undersøkelsen) siden 2010. Hvert enkelt foretak skal følge med på utviklingen i andel sykehusopphold med minst én pasientskade og bruke egne resultater til kvalitetsforbedringsarbeid. I tillegg utarbeides denne årlige rapporten for å følge omfanget av pasientskader på nasjonalt nivå og vurdere om målsetningen i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 oppnås.

Undersøkelsen som oppsummeres i denne rapporten dekker opphold på somatiske sykehus i spesialisthelsetjenesten i Norge. Sykehusopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er ikke med i undersøkelsen fordi GTT-metoden som anvendes i Norge per i dag ikke er tilpasset disse pasientgruppene.

Resultatene som presenteres er andel sykehusopphold med minst én pasientskade, skadenes alvorlighetsgrad, og skadetype. Beregninger gjøres med utgangspunkt i data fra alle helseforetak og sykehus som gjennomfører journalundersøkelsen det aktuelle året.

Denne rapporten presenterer resultatene for 2020 og trender i perioden 2012 til 2020.

2020 var et år preget av covid-19. Vi har ikke informasjon om noen av innleggelsene som er trukket ut til journalgransking dreier seg om pasienter som er innlagt med covid-19, og kan derfor ikke analysere effekten av covid-19 på forekomsten av pasientskader. Vi har imidlertid sett på om det er grunnlag for å si at det er sammenheng mellom forekomsten av pasientskade og helseforetakets belastning i form av andel pasienter innlagt med covid-19.

2 Metode

Strukturert journalundersøkelse er anerkjent som den mest sensitive metoden for å kartlegge omfanget av pasientskader i sykehus [2,3], og ble derfor valgt til dette formålet da pasientsikkerhetskampanjen startet i Norge i 2011 [4].

GTT-metoden er en internasjonalt anerkjent og standardisert prosedyre for å gjennomføre strukturert journalundersøkelse ved somatiske sykehusopphold. Med GTT-metoden kan man identifisere pasientskader i det enkelte sykehus. Den opprinnelige manualen for GTT-metoden er laget av Institute for Healthcare Improvement (IHI) [5]. Det er laget en norsk veileder basert på den opprinnelige manualen, som spesifiserer hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og rapporteres i Norge [6]. Beskrivelsen av metoden er hentet fra denne veilederen.

2.1 Definisjon av pasientskade

En pasientskade defineres som følger:

"Utsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang."

2.2 Prosess

To ganger i måneden trekkes 10 tilfeldig valgte journaler fra avsluttede sykehusopphold som har vart i minst 24 timer for pasienter som er 18 år og eldre. Disse journalene gjennomgås deretter av et GTT-team for identifisering av pasientskader. Dette teamet består av to sykepleiere og en lege. De to sykepleierne undersøker journalene uavhengig av hverandre og bruker en liste med kriterier, såkalte triggere, for å identifisere mulige pasientskader. Sykepleierne sammenligner så sine resultater og legger dem frem for legen i GTT-teamet. Teamet kommer sammen frem til om det har vært en skade, alvorligetsgraden av skaden og skadetype. Dersom det er uenighet i teamet om det har vært en skade eller ikke, er det legen som har det siste ordet.

2.3 Triggere

GTT-metoden inneholder i alt 57 triggere. Av disse gjelder 27 triggere alle somatiske pasienter, 4 er utelukkende beregnet på intensivpasienter, 14 er bare relevante for kirurgiske pasienter, 10 gjelder fødselsomsorg, og 2 gjelder kun for akuttmedisin.

2.4 Alvorligetsgrad

Identifiserte pasientskader kategoriseres etter alvorligetsgrad ved hjelp av følgende skala [6]:

- E. Forbigående skade som krevde behandling
- F. Forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold
- G. Langvarig skade eller varig mén
- H. Skade hvor livreddende behandlingstiltak var nødvendig
- I. Skade som bidro til at pasienten døde

2.5 Skadetyper

Som tillegg til den opprinnelige GTT-metoden klassifiseres skader etter skadetyper. Det finnes 23 ulike skadetyper. Skadetyppene er ikke innbyrdes ekskluderende, og en skade kan registreres som én eller flere skadetyper. For eksempel vil en blødning knyttet til overmedisinering registreres både som blødning og som legemiddelrelatert skade.

2.6 Tilpasninger

Sammensetningen av team som har deltatt i undersøkelsen har variert over tid siden oppstarten av undersøkelsen i 2010. Noen helseforetak har ett team som gransker journaler for hele foretaket, mens andre helseforetak har etablert team som spesialiserer seg på gransking av innleggeler for eksempel innen kirurgi og medisin. Noen helseforetak undersøker flere enn 20 journaler per måned, som er minimumskravet.

2.7 Fremstilling av resultatene

Resultatene fremstilles som prosentandel sykehusopphold der det identifiseres minst én pasientskade. Et sykehusopphold er regnet som et sammenhengende sykdomsforløp. I noen tilfeller kan forløpet strekke seg over flere sykehus, for eksempel som følge av funksjonsfordeling.

2.8 Metodens begrensninger

Slik GTT-undersøkelsen gjennomføres i dag, samles det ikke inn data som gjør det mulig å justere for risiko knyttet til medisinsk behandling som er gitt eller hvor alvorlig pasientens tilstand er. GTT-teamet vurderer hvilke konsekvenser skaden har hatt for pasienten, uten å vurdere om skaden kunne ha vært unngått eller ikke.

Prosedyren tar kun med skader oppstått som følge av behandling, og ikke som følge av fravær av behandling. Dette gjelder vel og merke utenfor sykehus, da sykehusinnleggelse i seg selv regnes som behandling. Dermed vil for eksempel en hjerneblødning som oppstår på grunn av ubehandlet høyt blodtrykk utenfor sykehus ikke regnes som skade, mens en hjerneblødning som oppstår i sykehus på grunn av ubehandlet høyt blodtrykk regnes som skade.

2.9 Metodens pålitelighet

Det er forsket på om uavhengige team som undersøker de samme journalene på samme sykehus, kommer fram til tilsvarende resultat. Det gjør de i så stor grad at man mener metoden er tilstrekkelig pålitelig til å kartlegge og beregne omfang av pasientskade i sykehus på nasjonalt nivå [7]. Hvordan teamene gjør undersøkelsen og hvordan de tolker pasientskader, kan teoretisk endre seg over tid [8]. Derfor holder Helsedirektoratet obligatoriske kurs og årlege seminarer, hvor man gjennomgår eksempler på hvordan man tolker definisjonen på pasientskade.

3 Datagrunnlaget

3.1 Årskjema

Helseforetakene og sykehusene rapporterer til Helsedirektoratet på et fastlagt skjema som er grunnlaget for beregning av det årlige estimatet i denne rapporten. Årskjemaet inneholder informasjon om sykehusopphold der det har blitt oppdaget minst én skade, alvorligetsgraden av skaden, skadetypen(e) og om skaden oppstod innenfor eller utenfor spesialisthelsetjenesten. En skade kan for eksempel ha oppstått i forbindelse med behandling i primærhelsetjenesten. Årskjemaet inneholder også informasjon om antall undersøkte journaler, antall sykehusopphold som journalene er trukket fra, og om skaden oppstod i helseforetaket det rapporteres fra, eller i et sykehus som pasienten har vært sendt til under oppholdet som følge av funksjonsfordeling.

3.2 Sykehusopphold med mer enn én skade

Dersom det oppstår flere skader under ett og samme sykehusopphold, skal alle skadene rapporteres med tilhørende alvorligetsgrad og skadetype. Skadene kan være av ulik alvorligetsgrad. Et unntak gjelder for såkalte kaskadeskader, hvor en mindre alvorlig skade fører til en mer alvorlig skade. En kaskadeskade rapporteres med de aktuelle skadetypene, som en skade av den mest alvorlige graden. Det kan for eksempel være en pasient som faller på sykehuset, får et benbrudd, og erfarer en dødelig respiratorisk komplikasjon når benbruddet opereres. En slik skade vil rapporteres som både fall, fraktur, og respiratorisk komplikasjon, under alvorligetsgraden I.

3.3 Populasjon

I 2020 deltok 34 team i GTT-undersøkelsen. Det er ett team mer enn de to foregående år, noe som skyldes at Finnmarkssykehuset nå har ett team som gransker medisinske sykehusopphold og ett team som gransker kirurgiske sykehusopphold. Samtlige av de 34 GTT-teamene fra 19 helseforetak og 5 private sykehus leverte årskjema for 2020.

De fleste GTT-team undersøker 10 journaler fra avsluttede sykehusopphold for hver halve måned gjennom hele året, til sammen 240 journaler i året. Unntak er Diakonhjemmet Sykehus som undersøker 20 journaler hver halve måned (totalt 480 journaler per år), Martina Hansens Hospital som gransker 230 journaler i året på grunn av en halv måned stengning om sommeren, og Helse Bergen som undersøker 40 journaler hver halve måned (totalt 960 journaler per år). I 2020 gransket Betanien Hospital kun 227 opphold fordi de i første periode i mars og de to periodene i april hadde færre enn 10 pasienter inneliggende. Martina Hansens Hospital utvekslet både pasienter og personell med Bærum sykehus fra midten av mars til mai.

GTT-teamene undersøkte til sammen 9 097 sykehusopphold i 2020. Dette utgjør 1,6 % av de totalt 563 228 sykehusoppholdene de undersøkte journalene er tilfeldig trukket fra. Antall sykehusopphold som journalene er trukket fra, har variert lite i perioden 2012 til 2019. I tråd med et lavere aktivitetsnivå i sykehusene på grunn av covid-19, ble det i 2020 trukket fra et noe lavere antall journaler enn de siste årene. Endringen mellom 2020 og 2019 i antall sykehusopphold det er trukket fra varierer mellom de ulike GTT-teamene (vedlegg 4). Totalt sett er det en nedgang på ca. 9 % sammenlignet med 2019.

3.4 Registrering av data

GTT-teamene registrerte tidligere sine resultater i den webbaserte databasen Extranet, som ble administrert av Helsedirektoratet. Fra og med 2020 skjer all rapportering til Helsedirektoratet på Excel-filer. Helsedirektoratet har lagt til rette for at helseforetakene kan lage sine egne tidsserier og

publiserer i tillegg tidsserier hvert tertial. Helseforetakene kan dermed overvåke sine egne resultater over tid i forbindelse med målrettet forbedringsarbeid.

4 Hvordan analyseres tallene

4.1 Estimert andel med tilhørende konfidensintervall

Estimatene for andel sykehusopphold med minst én pasientskade er basert på data som hvert GTT-team har rapportert i årsskjemaet. Estimater er beregnet for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I) og for de individuelle alvorlighetsgradene (E, F, G, H og I). Estimatene er vektede gjennomsnitt av andel sykehusopphold med minst én pasientskade i gitt alvorlighetsgrad, for alle team. Hvert team får tildelt en vekt som gjenspeiler andel av den nasjonale sykehusopphold-populasjonen som granskningsteamet dekker.

Ved beregning av samlekategorien E-I teller man kun én skade per sykehusopphold, selv om det kan ha vært flere skader av ulik alvorlighetsgrad under samme opphold. Ved beregning av de individuelle alvorlighetsgradene, inngår flere skader. Samlekategorien E-I er derfor ikke summen av de individuelle alvorlighetsgradene. Et sykehusopphold med to skader av alvorlighetsgrad E og G telles kun som én skade i samlekategorien E-I, men telles to ganger i de individuelle alvorlighetsgradene; som én skade av alvorlighetsgrad E og én skade av alvorlighetsgrad G. Resultatene for de individuelle alvorlighetsgradene kan benyttes som et supplement til analysen av samlekategorien E-I [9].

95 % ikke-parametriske konfidensintervall (KI) for estimatene er beregnet ved bruk av 10 000 bootstrap-simuleringer [10]. Dataene re-samples 10 000 ganger med tilbakelegging, dvs. at én observasjon kan trekkes flere ganger. Sannsynligheten for å trekke en observasjon fra dataene er lik vekten tildelt hvert team. Observasjoner med større vekt har høyere sannsynlighet for å bli trukket ut. Gjennomsnitt for re-samplet datasett beregnes og 95 % konfidensintervall er gitt ved 2,5 og 97,5 percentilene fra de 10 000 gjennomsnittsverdiene.

4.2 Tidstrender

Hypotesen om at det har vært en signifikant reduksjon av pasientskader i samlekategorien E-I er testet ved å analysere tidstrenden fra 2012 til 2020. Denne hovedtrenden er testet med et signifikansnivå på 5 %, dvs. ingen Bonferroni-korreksjon.

Alle tidstrender er analysert med en lineær regresjon av estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade i gitt alvorlighetsgrad fra 2012 til 2020, dvs. ni observasjoner per analyse. Den lineære tidstrenden er plottet sammen med estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade i gitt alvorlighetsgrad.

4.3 Skadetyper

Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for de enkelte skadetyppene er estimert for samlekategorien E-I, og 95 % ikke-parametriske konfidensintervall for estimatene er beregnet. Ingen testing er utført for trend innenfor den enkelte skadetype.

I årets rapport har vi for første gang samlet skadetyper som har sin årsak i kirurgi i én gruppe og kalt denne *kirurgisk skade*. Bakgrunnen for dette er at man i Sverige ser en signifikant økt risiko for skade ved innleggelse som omfatter kirurgi. I tillegg er det en signifikant høyere forekomst av skader knyttet til kirurgi i Norge, sammenlignet med Sverige [11]. Ved å telle alle skader som er knyttet til kirurgi under ett, kan vi sette økt fokus på dette området.

Skadetypene som er samlet i gruppen *kirurgisk skade* er:

Kode	Skadetype
8	Postoperativ sårinfeksjon
11	Reoperasjon
12	Postoperativ blødning/ hematom
13	Postoperativ respiratorisk komplikasjon
14	Organskade
15	Forveksling ved operasjon
16	Annен kirurgisk komplikasjon

Et sykehusopphold har skadetype *kirurgisk skade* dersom en eller flere av skadetypene i tabellen over er registrert på en eller flere av skadene som er funnet ved sykehusoppholdet.

5 Resultater 2020

5.1 Omfanget av pasientskader


I 2020 er det estimert at det oppstod minst én pasientskade i 13,1 % av sykehusoppholdene (alvorlighetsgrad E-I) ved somatiske sykehus i Norge. Se tabell 1.

Tabell 1 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i norske sykehus i perioden 2012-2020.

Alvorlighetsgrader	% av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sykehusopphold med minst én skade (E-I)	13,7 % (12,5-15,1)	13,0 % (11,7-14,2)	13,9 % (12,1-16,1)	13,7 % (12,1-15,3)	13,9 % (12,3-15,6)	13,7 % (12,5-15,2)	11,9 % (10,8-13,1)	12,4 % (11,4-13,6)	13,1 % (11,9-14,5)
Antall undersøkte sykehusopphold	11 728	10 986	8 804	8 887	8 390	7 430	8 870	8 870	9 097
Antall sykehusopphold som det er trukket fra	593 046	569 714	569 180	601 602	631 860	609 247	613 392	616 227	563 228
Antall GTT-team	47	45	36	35	34	30	33	33	34

Trenden for andel sykehusopphold med minst én pasientskade for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I) har vært svakt nedadgående fra 2012 til 2020 ($p = 0,148$), se figur 1.

Figur 1 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for samlekategorien E-I, med 95 % konfidensintervall og lineær tidstrend for perioden 2012-2020.



5.2 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade etter alvorlighetsgrad

Tabell 2 viser tall for de individuelle alvorlighetsgradene E, F, G, H og I.

I 2020 var det pasientskader som var forbigående og førte til forlenget sykehusopphold (F) som var de mest hyppige med 7,6 %. Forbigående skade som kun krevde behandling (E) forekom ved 5,5 % av oppholdene. De mest alvorlige skadene, langvarig skade eller varig mén (G), der det var nødvendig med livreddende behandling (H) eller der skaden bidro til at pasienten døde (I), forekom ved henholdsvis 0,65 %, 0,30 % og 0,15 % av sykehusoppholdene.


**Tabell 2 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i norske sykehus i perioden 2012-2020.
Individuelle alvorlighetsgrader.**

Alvorlighetsgrader	% av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sykehusopphold med forbigående skade som krevde behandling (E)	6,5 % (5,4-7,5)	6,4 % (5,7-7,2)	6,5 % (5,5-7,5)	6,1 % (5,3-6,9)	5,1 % (4,4-5,8)	5,3 % (4,7-6,0)	5,2 % (4,6-5,8)	4,1 % (3,4-4,8)	5,5 % (4,8-6,2)
Sykehusopphold med forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold (F)	6,4 % (5,5-7,3)	6,7 % (5,7-7,8)	7,3 % (5,9-8,8)	7,9 % (6,5-9,4)	8,8 % (7,3-10,3)	8,2 % (7,2-9,7)	6,9 % (6,0-8,0)	8,4 % (7,6-9,4)	7,6 % (6,5-8,8)
Sykehusopphold med langvarig skade eller varig mén (G)	0,70 % (0,53-0,86)	0,72 % (0,53-0,92)	0,65 % (0,49-0,85)	0,59 % (0,40-0,79)	0,63 % (0,40-0,87)	0,76 % (0,51-1,05)	0,37 % (0,27-0,51)	0,44 % (0,27-0,66)	0,65 % (0,45-0,87)
Sykehusopphold med skade som førte til at livreddende tiltak var nødvendig (H)	0,37 % (0,21-0,53)	0,20 % (0,08-0,33)	0,28 % (0,16-0,42)	0,17 % (0,10-0,26)	0,28 % (0,17-0,39)	0,12 % (0,06-0,20)	0,28 % (0,13-0,54)	0,20 % (0,13-0,25)	0,30 % (0,19-0,44)
Sykehusopphold med skade som bidro til at pasienten døde (I)	0,37 % (0,23-0,51)	0,30 % (0,21-0,40)	0,25 % (0,16-0,35)	0,17 % (0,07-0,27)	0,27 % (0,20-0,36)	0,19 % (0,11-0,25)	0,18 % (0,11-0,27)	0,12 % (0,07-0,17)	0,15 % (0,07-0,25)

Av figur 2 ser vi at, selv om det har vært en økning i forekomst av sykehusopphold med forbigående pasientskader som kun krevde behandling (E) fra 2019 til 2020, er det en statistisk signifikant avtagende trend for perioden 2012 til 2020 ($p = 0,009$).

Fra 2019 til 2020 har det vært en nedgang i forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold (F). Trenden for perioden 2012 til 2020 er svakt, men ikke statistisk signifikant økende ($p = 0,147$).


Figur 2 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for de individuelle alvorlighetsgradene E og F, med lineære tidstrender for perioden 2012-2020.




De mest alvorlige skadene som har gitt langvarig skade eller varig mén (G), skade hvor det har vært nødvendig med livreddende behandlingstiltak (H), eller der skaden har bidratt til at pasienten døde (I) er mindre hyppige enn skader av lettere alvorlighetsgrader (E og F). Disse er derfor vist i separate figurer for å fremstille trenden bedre. Figurene 3 og 4 viser den estimerte forekomsten av disse over tid.

I perioden 2012 til 2020 har andelen av skader som resulterte i langvarig skade eller varig mén (G) hatt en svakt nedadgående trend ($p = 0,165$). Andelen skader som krevde livreddende behandling (H) har vært stabil i perioden ($p = 0,615$), og andelen skader som bidro til at pasienten døde (I) har hatt en statistisk signifikant nedgang ($p = 0,002$).

Figur 3 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for individuell alvorlighetsgrad G, med lineær tidstrend for perioden 2012-2020.



Figur 4 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for de individuelle alvorlighetsgradene H og I, med lineære tidstrender for perioden 2012-2020.



5.3 Målloppnåelse for det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde


Det er ikke gjennomført analyser for målloppnåelse for det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde. Kontrollgrafer, som fremstiller utviklingen for det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde de siste fem årene, finnes i vedlegg 2. Disse viser at det er relativt stor variasjon i utviklingen over tid når det gjelder andel sykehusopphold med minst én skade. For noen helseforetak/sykehus/fagområder ser vi en nedgang i pasientskader, hos andre er det en økning.

Aktivitetsnivået for de ulike helseforetakene har blitt påvirket av covid-19. Trekking av sykehusopphold fra et mindre grunnlag enn vanlig, kan påvirke resultatene for det enkelte helseforetak. Vedlegg 4 viser antall sykehusopphold det er trukket fra i 2019 og 2020 per GTT-team. Totalt sett er det en nedgang på ca. 9 % i antall sykehusopphold det er trukket fra sammenlignet med 2019.

5.4 Skadetyper

Figur 5 viser andel sykehusopphold med minst én pasientskade i 2020 for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I) fordelt på skadetyper, med 95 % konfidensintervall. Skadetyper som er knyttet til kirurgi (se avsnitt 4.3) er markert med ** foran teksten og i lysegrønn farge). Når vi ser på skadetyper uten felles gruppering av *kirurgisk skade*, ser vi at de fire mest hyppige skadtypene er legemiddelrelatert skade (1,9 %), urinveisinfeksjon (1,8 %), postoperativ sårinfeksjon (1,6 %) og annen kirurgisk komplikasjon (1,6 %). De to sistnevnte tilhører gruppen *kirurgisk skade*.


Figur 5 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i 2020 fordelt på skadetyper, med 95 % konfidensintervall. Alvorlighetsgrad E-I.



Det oppsto en skade knyttet til kirurgi i 4,8 % av alle sykehusopphold, med 95 % konfidensintervall fra 4,0 % til 5,6 %.

Oversikt over forekomsten av de 23 ulike skadetyppene for alvorlighetsgrad E-I finnes i vedlegg 1. Det har vært noe varierende rekkefølge på hyppigheten av de ulike skadetyppene i perioden 2012 til 2020, samtidig som enkelte skadetyper gjennomgående forekommer hyppigere enn andre. Figur 6 viser variasjonen i forekomsten av de ulike skadetyppene for perioden 2016 til 2020 og alle alvorlighetsgrader samlet (E-I).

Figur 6 Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i 2016-2020 fordelt på skadetyper. Alvorlighetsgrad E-I.



6 Om resultatene

6.1 Resultatene oppsummert

I 2020 er det estimert at det oppstod minst én pasientskade i 13,1 % av sykehusoppholdene (alvorlighetsgrad E-I) ved somatiske sykehus i Norge. Resultatet for 2020 er høyere enn i 2019, men det er en svakt nedadgående trend i perioden 2012 til 2020, der omfanget stort sett har ligget i intervallet 12-14 %.

Det har vært ulik grad av nedgang i pasientskader for de individuelle alvorlighetsgradene fra 2012 til 2020, med unntak av skader som var forbigående, men som førte til forlenget sykehusopphold. Fra 2019 til 2020 ser vi at det har vært en varierende grad av økning i forekomst av sykehusopphold med pasientskader for alle individuelle alvorlighetsgrader, med unntak av forbigående skader som førte til forlenget sykehusopphold (F).

Ser vi på skadetyper uten felles gruppering av *kirurgisk skade*, er de fire mest hyppige skadetypene legemiddelrelatert skade, urinveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon og annen kirurgisk komplikasjon. Dette er i tråd med resultater fra tidligere år.

Den nye grupperingen av skader knyttet til kirurgi viser tydelig at denne typen skade forekommer hyppig, i 4,8 % av alle sykehusopphold. Siden GTT-undersøkelsen ikke samler inn informasjon om hvorvidt et sykehusopphold er relatert til kirurgi eller ikke, er dette nærmeste indikasjon vi får for pasientskade knyttet til kirurgiske sykehusopphold. Foreløpige tall (per 24. august 2021) for 2020 fra Samdata [12] viser at andelen døgnopphold i sykehus knyttet til kirurgi, av totalt antall døgnopphold, var 27 %. Dermed forstår vi at omfanget av skader ved sykehusopphold knyttet til kirurgi ligger betydelig høyere enn estimatet for alle sykehusopphold beregnet i denne rapporten. Det er i tråd med svenske resultater og tidligere forskning som viser at det er høyere risiko for pasientskade knyttet til kirurgi [13,14]. Det er derfor god grunn til å oppfordre helseforetakene og sykehusene til å sette høyt fokus på skadene som oppstår ved kirurgi, og vurdere om det finnes forbedringspotensialer. Flere sykehus har egne GTT-team for kirurgiske avdelinger. Det kan flere opprette for å undersøke omfanget av kirurgiske skader på hvert helseforetak.

6.2 Covid-19-pandemien

Ettersom det ikke samles inn noe bakgrunnsinformasjon hverken om innleggelsene der det har oppstått skade eller innleggelsene der det ikke har oppstått skade, er det svært vanskelig å tolke resultatene fra GTT-undersøkelsen opp mot andre resultater. Det ville imidlertid være unaturlig å presentere en rapport om omfang av pasientskader i 2020 uten å nevne covid-19.

De helseforetakene/sykehusene som har hatt størst belastning i antall liggedøgn med covid-19 pasienter i forhold til antall liggedøgn for andre pasientgrupper er Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold [15]. Av kontrollgrafene (vedlegg 2) for disse sykehusene ser vi at Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har det laveste omfanget av pasientskader siden 2015. Ahus og Sykehuset Østfold ligger omtrent på samme nivå i omfang av pasientskader som i 2019.

Færre sykehusopphold enn vanlig, kan påvirke resultatene for det enkelte helseforetak. Av kontrollgrafene kan vi imidlertid ikke se en systematisk sammenheng mellom endring i antall sykehusopphold det er trukket fra og endring i omfanget av pasientskader.

6.3 Sverige

I Sverige har man ikke publisert den tradisjonelle årsrapporten for *Markörbaserad journalgranskning – skador i somatisk vård* for 2020. Derimot har de gjennomført en utvidet journalgransking [16] der de sammenligner 1 529 sykehusinnleggelses med årsak i covid-19 og 2 601 sykehusinnleggelses som ikke var knyttet til covid-19 for perioden mars til juni. Rapporten konkluderer med at det oppsto skade i 18,4 % av sykehusinnleggelsene som skyldtes covid-19 mot 9,7 % i gruppen innleggelsene som ikke skyldtes covid-19. Sverige har hatt et betydelig høyere antall covid-19 innleggelses enn Norge, og tallene kan derfor ikke overføres til norske forhold.

7 Utviklingsmuligheter

7.1 Metoden

For å få en helhetlig forståelse av omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus, bør denne rapporten ses i sammenheng med andre tall og rapporter som kan belyse pasientskader. Relevante kilder er Helsetilsynet, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), Norsk pasientskadeerstatning (NPE), undersøkelser av pasienttilfredshet, måling av sykehuisinfeksjoner, implementering av pasientsikkerhetstiltak, data fra nasjonale medisinske kvalitetsregister, undersøkelser av pasientsikkerhetskultur og nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor pasientsikkerhet [17].

GTT-undersøkelsen gir oss informasjon om omfanget av pasientskader, alvorlighetsgraden av skadene og hvilke skadetyper som oppstår. Vi får lite informasjon om hvorfor skadene oppstår utover det som ligger implisitt i noen av skadtypene. Selv om man med stor forsiktighet kan tolke positiv eller negativ tidstrend i helseforetakene, er det i dag ikke mulig å gjøre en direkte sammenligning mellom helseforetakene. Det skyldes at vi ikke kan korrigere for eventuelle forskjeller i pasientsammensetning, at antallet sykehushophold som granskes er lavt og at vi ikke kjenner godt nok til hvor stor samstemthet det er i de ulike teamenes vurdering av skade.

Helsedirektoratet har startet et prosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet, som har som mål å videreutvikle GTT-metoden for å muliggjøre en nasjonal kvalitetsindikator for pasientskade.

Prosjektet skal:

- Utvikle nye mål for å beskrive og forstå variasjon i vurdering av pasientskader
- Gi ny og forbedret innsikt i utvalgsmetodikk for datagrunnlaget fra GTT-undersøkelsen
- Utvikle ny metodikk for risikojustering av pasientskadenvå
- Gi ny og forbedret innsikt i pasientsikkerhetskulturen på sykehusene

Det er også relevant å anvende GTT-metoden innenfor andre områder enn somatikk. En håndbok for GTT-metoden tilpasset psykisk helsevern er utviklet for norsk kontekst ved Helse Nord-Trøndelag Helseforetak. Det er også utviklet en håndbok for bruk av GTT-metoden på sykehjem i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken (Akershus). Denne er ikke pilotert og det foreligger ingen konkrete planer om det. Det er viktig å utrede utfordringsbildet for metoden innenfor somatikk før den kan tas i bruk i stor skala innenfor andre områder.

7.2 Redusere omfanget av pasientskader

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 har som målsetning å redusere omfanget av pasientskader. De overordnede virkemidlene i planen er å bedre pasientsikkerhetskulturen, og skape varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Planen setter særlig fokus på områdene legemiddelhåndtering og infeksjoner, områder vi kjenner igjen som de mest hyppige skadtypene i resultatene presentert i denne rapporten. Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023, med mål om å redusere helsetjenesteassosierede infeksjoner [18], understøtter også arbeidet med å redusere omfanget av pasientskader.

For det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde er det viktig å se på kontrollgrafene i vedlegg 2, vurdere trend og sette inn tiltak. GTT-teamene kan bringe innsikt i oppståtte pasientskader inn i ulike fora som jobber med kvalitetsforbedring ved sine enheter. Helsedirektoratet har også lagt til rette for at man lokalt kan følge med på sine egne resultater kontinuerlig, se

[https://www.itryggehender24-7.no/malinger/global-trigger-tool-gtt/omfanget-av-pasientskader-ved-somatiske-sykehus.](https://www.itryggehender24-7.no/malinger/global-trigger-tool-gtt/omfanget-av-pasientskader-ved-somatiske-sykehus)

7.3 Redusere omfanget av pasientskader knyttet til kirurgi

Ved å samle alle skadetyper knyttet til kirurgi kommer risikoen knyttet til kirurgisk behandling tydeligere frem. Det er derfor god grunn til å fortsatt ha et høyt fokus på forebygging av skader knyttet til kirurgi. I pasientsikkerhetsprogrammet og -kampanjen var én av tiltakspakkene Trygg kirurgi. Innholdet i tiltakspakken videreføres i disse dager til et nasjonalt faglig råd.

Det kan være at man bør se på feltet med nye øyne i samarbeid med fagmiljøer og andre aktører, for eventuelt å identifisere risikoområder som hittil er oversett. Det kan for eksempel handle om krav som stilles til kompetanse, tverrfaglig samarbeid og sentralisering av kirurgisk behandling.

Referanser

1. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023. In: <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf/attachment/inline/79c83e08-c6ef-4adc-a29a-4de1fc0ef:94a7c49bf505dd36d59d9bf3de16769bad6c32d5/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf>
2. Classen DC, Resar R, Griffin F, Federico F, Frankel T, Kimmel N, Whittington JC, Frankel A, Seger A, James BC: 'Global Trigger Tool' Shows That Adverse Events In Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. *Health Aff (Millwood)* 2011, 30(4):581-589.
3. Sari AB-A, Sheldon TA, Cracknell A, Turnbull A. Sensitivity of routine system for reporting patient safety incidents in an NHS hospital: retrospective patient case note review. *BMJ*. 2007;334(7584):79.
4. Deilkås ET, Bukholm G, Ringard Å. Norway: Improving Patient Safety in Norwegian Hospitals through a Standardized Approach toward the Measurement and Monitoring of Adverse Events In: Braithwaite J, editor. *Health Systems Improvement Across the Globe: Success Stories from 60 Countries*. Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis; 2017.
5. Griffin F, Resar R: IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events In: IHI Innovation series. 2nd edn. Cambridge, MA; 2009.
6. Veileder for bruk av Global Trigger Tool tilpasset norske forhold. Versjon mars 2017. In: I trygge hender; 2018. In: <https://www.itryggehender24-7.no/malinger/global-trigger-tool-gtt/praktisk-informasjon-for-global-trigger-tool-gtt-team>
7. J.Sharek P, Parry G, Goldmann D, Bones K, Hackbart A, Resar R, A.Griffin F, Rhoda D, Murphy C, P.Landrigan C: Performance Characteristics of a Methodology to Quantify Adverse Events over Time in Hospitalized Patients. *Health Serv Res* 2010, 46(2):654-678.
8. Schildmeijer K, Nilsson Arrestedt K, Perk J: Assessment of adverse events in medical care: lack of consistency between experienced teams using the global trigger tool. *BMJ Quality & Safety* 2012, Vol 21: 307-314.
9. Deilkås ECT, Bukholm G, Lindstrøm JC, Haugen M. Monitoring adverse events in Norwegian hospitals from 2010 to 2013. *BMJ open*. 2015;5(12)
10. Efron B, Tibshirani RJ. *An introduction to the bootstrap*. London: Chapman & Hall, 1993 Bradley.
11. Deilkås ET, Haugen M, Risberg MB, Narbuvold H, Flesland Ø, Nylén U, Rutberg H. Longitudinal rates of hospital adverse events that contributed to death in Norway and Sweden from 2013 to 2018. *Journal of Patient Safety and Risk Management* 2021, Vol 26(4): 153-160. In: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/25160435211026125>
12. Samdata. Døgnbehandling – Bruk av tjenester i somatikken. In: Helsedirektoratet; 2021. In: <https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/f2d19a88-1302-48e4-b3c2-fba7292bb7ff?e=false&vo=viewonly>
13. Sveriges Kommuner och Regioner. Markörbaserad journalgranskning - SKADOR I SOMATISK VÅRD JANUARI 2013–DECEMBER 2019, NATIONELL NIVÅ. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner; 2019.

14. Leape LL, Brennan TA, Laird N, Lawthers AG, Localio AR, Barnes BA, et al. The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II. The New England Journal of Medicine. 1991;324(6):377-84.
15. Ett år inn i koronapandemien – ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar. Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. April 2021. ISBN: 978-82-93141-48-8. In: Helse Nord; 2021. In: <https://helse-nord.no/Documents/Ett%20%C3%A5r%20inn%20i%20koronapandemien.pdf>
16. Skador vid vård av covid-19 patienter, lärdomar från markörbaserad journalgranskning av pandemivård mars-juni 2020. Sveriges Kommuner och Regioner. 2021. ISBN 978-91-7585-860-9.
17. Nasjonale kvalitetsindikatorer. Helsedirektoratet; 2021. In: <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer>
18. Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierete infeksjoner 2019–2023. In: www.regjeringen.no/contentassets/714aa1437e2545f7bb4914a3474cd691/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern.pdf

Vedlegg 1 Skadetyper

Tabellen under viser andel sykehusopphold med minst én pasientskade for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I), fordelt på skadetyper i perioden 2012 til 2020.

Skadetype ¹⁾	Kode	% av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall) ²⁾									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv væsketerapi)	17	2,1 % (1,6-2,6)	1,9 % (1,3-2,4)	1,9 % (1,3-2,6)	2,4 % (1,8-3,0)	2,2 % (1,7-2,8)	1,8 % (1,5-2,4)	1,9 % (1,7-2,4)	2,1 % (1,6-2,8)	1,9 % (1,4-2,4)	
Urinveisinfeksjon	5	1,7 % (1,4-2,1)	2,1 % (1,8-2,5)	2,2 % (1,8-2,7)	1,9 % (1,4-2,4)	1,8 % (1,3-2,3)	2,0 % (1,5-2,4)	1,6 % (1,3-1,9)	1,6 % (1,3-1,8)	1,8 % (1,4-2,2)	
Postoperativ sårinfeksjon	8	1,7 % (1,4-2,0)	1,6 % (1,3-2,0)	1,4 % (1,1-1,8)	1,4 % (1,2-1,6)	1,8 % (1,5-2,2)	2,0 % (1,7-2,2)	1,2 % (1,0-1,5)	1,2 % (1,0-1,5)	1,6 % (1,3-1,9)	
Annен kirurgisk komplikasjon	16	1,6 % (1,2-2,0)	1,9 % (1,5-2,3)	1,6 % (1,3-1,9)	1,5 % (1,2-1,7)	2,0 % (1,6-2,3)	1,5 % (1,3-2,1)	1,7 % (1,4-2,0)	1,7 % (1,5-2,0)	1,6 % (1,1-2,0)	
Annен infeksjon	10	1,8 % (1,4-2,2)	1,3 % (1,1-1,6)	1,4 % (1,1-1,8)	1,7 % (1,3-2,1)	1,4 % (1,2-1,6)	1,4 % (1,0-1,7)	1,2 % (1,0-1,6)	1,0 % (0,7-1,3)	1,5 % (1,2-1,8)	
Nedre luftveisinfeksjon	7	1,7 % (1,2-2,0)	1,3 % (1,0-1,5)	1,7 % (1,2-2,3)	1,3 % (1,0-1,5)	1,4 % (1,0-1,7)	1,8 % (1,4-2,2)	0,9 % (0,7-1,2)	1,3 % (1,0-1,5)	1,2 % (0,9-1,5)	
Trykksår	21	0,9 % (0,6-1,2)	0,6 % (0,4-0,8)	0,7 % (0,4-1,0)	0,9 % (0,5-1,3)	0,7 % (0,5-0,9)	0,6 % (0,4-0,9)	0,7 % (0,5-1,0)	0,9 % (0,6-1,2)	1,1 % (0,7-1,5)	
Postoperativ blødning/hematom	12	0,6 % (0,4-0,8)	0,8 % (0,6-1,1)	1,0 % (0,8-1,3)	0,7 % (0,5-0,9)	0,9 % (0,7-1,1)	0,8 % (0,6-1,0)	0,8 % (0,6-1,0)	1,0 % (0,7-1,5)	0,9 % (0,6-1,1)	
Blødning	2	1,4 % (1,1-1,6)	1,0 % (0,9-1,1)	1,1 % (0,8-1,6)	0,8 % (0,6-1,1)	1,1 % (0,8-1,5)	0,5 % (0,4-0,7)	1,0 % (0,7-1,4)	0,7 % (0,5-1,0)	0,8 % (0,5-1,2)	
Reoperasjon	11	0,6 % (0,5-0,8)	0,8 % (0,6-1,0)	0,8 % (0,5-1,0)	0,7 % (0,5-0,8)	0,8 % (0,5-1,0)	0,9 % (0,5-1,2)	0,5 % (0,3-0,8)	0,5 % (0,3-0,7)	0,7 % (0,5-1,0)	
Organskade	14	0,4 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,2-0,6)	0,5 % (0,4-0,7)	0,5 % (0,3-0,7)	0,3 % (0,2-0,5)	0,3 % (0,2-0,4)	0,7 % (0,5-0,9)	0,7 % (0,5-0,9)	
Trombose/ emboli	20	0,3 % (0,2-0,5)	0,4 % (0,3-0,5)	0,3 % (0,1-0,6)	0,2 % (0,2-0,3)	0,4 % (0,2-0,5)	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,3-0,5)	0,3 % (0,2-0,4)	0,6 % (0,4-0,8)	
Øvrige skader (forsiktiget diagnose)	23	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,2-0,6)	0,4 % (0,2-0,7)	0,2 % (0,1-0,4)	0,5 % (0,3-0,7)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,2-0,5)	0,6 % (0,4-0,7)	0,3 % (0,2-0,5)	
Postpartum/ obstetrisk skade	19	0,4 % (0,2-0,5)	0,2 % (0,1-0,4)	0,4 % (0,3-0,5)	0,6 % (0,3-0,8)	0,7 % (0,5-0,9)	0,4 % (0,3-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)	0,4 % (0,3-0,4)	0,3 % (0,2-0,5)	
Fallskade	3	0,6 % (0,4-0,7)	0,4 % (0,2-0,5)	0,5 % (0,3-0,7)	0,8 % (0,6-1,0)	0,5 % (0,3-0,7)	0,4 % (0,3-0,6)	0,4 % (0,4-0,6)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,5)	
Allergisk reaksjon	1	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,5)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,2 % (0,1-0,4)	
Medisinsk teknisk skade	18	0,1 % (0,1-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)	0,1 % (0,0-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,0)	0,2 % (0,1-0,2)	
Respiratorassosiert pneumoni	9	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,1-0,2)	
Forverring av kronisk sykdom	22	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,2)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,2)	

Skadetype ¹⁾		% av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall) ²⁾									
		Kode	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fraktur	4		0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,3 % (0,1-0,6)	0,3 % (0,1-0,5)	0,2 % (0,1-0,3)	0,3 % (0,1-0,5)	0,3 % (0,1-0,5)	0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,2)
Postoperativ respiratorisk komplikasjon	13		0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,1-0,2)	0,3 % (0,2-0,4)	0,3 % (0,2-0,4)	0,2 % (0,1-0,3)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)
Sentralvenøst kateter infeksjon	6		0,1 % (0,0-0,2)	0,1 % (0,0-0,1)	0,2 % (0,1-0,3)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)
Forveksling ved operasjon	15		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 % (0,0-0,1)	0,1 % (0,0-0,1)	0,0 %

- 1) Kategoriene for skadetyper er ikke innbyrdes ekskluderende, og ett tilfelle kan derfor være ført opp under flere skadetyper.
- 2) Noen av skadtypene har veldig få observerte skader, særlig i nederste del av tabellen. Dette medfører at estimatene og konfidensintervallene er usikre.

Vedlegg 2 Kontrollgrafer helseforetak og private sykehus

Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for 31 (av 34) helseforetak og private sykehus. Tallene er ment brukt til forbedringsarbeid i det enkelte helseforetak/sykehus.

Selv om GTT-teamene har utført undersøkelsen i henhold til samme veileder og med samme opplæring, vil det være usikkerhet knyttet til at GTT-team fra forskjellige helseforetak kan gi ulik vurdering av hva som regnes som en skade. Estimatene fra GTT-undersøkelsen kan derfor ikke brukes til å sammenligne resultatene fra helseforetak, sykehus eller fagområder. Man kan allikevel følge endringen innen det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde, og graden av endring mellom dem kan sammenlignes.

Så lenge variasjonen mellom teamene kan antas å være konstant, er den ikke til hinder for at resultatene kan aggregeres til et nasjonalt estimat. Det anbefales å sammenligne helseforetakenes/sykehusenes resultater med det nasjonale estimatet.

Resultatene fra GTT-undersøkelsen anbefales tolket sammen med resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer, som for eksempel sårinfeksjoner etter operasjon og korridorpasienter¹.

Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade

For hvert GTT-team presenteres estimat for andel sykehusopphold med minst én pasientskade per år, sammen med 95 % konfidensintervall (KI), som belyser estimatets usikkerhet².

Kontrollgraf

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader. Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder.

Den **brune stiplete linjen** viser andel sykehusopphold med minst én pasientskade (i prosent) for hver gang det trekkes journaler, som er to ganger i måneden.

Den **heltrukne sorte linjen** viser glattede data, som er et glidende gjennomsnitt av resultatene fra de 10 siste gangene det er trukket journaler. Dette reduserer inntrykket av den tilfeldige variasjonen, som er stor fordi det trekkes så få journaler hver gang. Den heltrukne sorte linjen må tolkes sammen med de enkeltstående datapunktene for å vurdere utviklingen.

¹ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer>

² Se vedlegg 3 for detaljert beskrivelse av beregningene av andel og konfidensintervall.

Den **stippled sorte linjen** viser gjennomsnittlig andel sykehusopphold med minst én pasientskade fra året før inneværende år, og blir derfor en referanseverdi for skadenivået året før (heretter kalt referanseverdien).

De **røde og blå linjene** er usikkerhetsintervaller for referanseverdiene, og utgjør kontrollgrenser for de glattede dataene. Kontrollgrensene er altså beregnet basert på data fra fjoråret³. De to røde linjene og de to blå linjene markerer henholdsvis 2 og 3 standardavvik over og under referanseverdien.

Denne måten å lage kontrollgrafer på gjør det enklere å sammenligne andel pasientopphold med minst én pasientskade i inneværende år med nivået året før. Målet er enten å redusere antall skader eller å sikre et lavt nivå. **Dersom det glidende snittet (heltrukken sort linje) kommer over de øvre kontrollgrensene, er det en indikasjon på at andel skader er i ferd med å øke utover nivået i foregående år.**

Det er mulig å sammenligne nivået i et år med et hvilket som helst tidligere år ved å se på den stippled sorte linjen for det aktuelle året. I dette vedlegget vises resultater for 2020 og de fire foregående år, eventuelt så mange år som teamet har data for.

Datagrunnlag for kontrollgrafene


Det er laget kontrollgrafer for 31 GTT-team. Datagrunnlaget er hentet fra innsendte Excel-skjema fra hvert enkelt GTT-team, som er kontrollert mot tallene i innsendt årsskjema.

Finnmarkssykehuset har fra 2020 fått nye team, et team for kirurgisk klinikk og et team for medisinsk klinikk. Teamene har levert data for 2020, og er med i den nasjonale sammenstillingen. Det trengs et år med data for å lage en referanseverdi, og det har derfor ikke blitt laget kontrollgrafer for disse teamene for 2020.

Martina Hansens Hospital har levert data for 2020, og er med i den nasjonale sammenstillingen. På grunn av koronasituasjonen har sykehuset hatt endringer i pasientgrunnlag og personale fra midten av mars til mai i 2020, og det har derfor ikke blitt laget kontrollgraf for dette teamet for 2020.

³ Se vedlegg 3 for detaljert beskrivelse av beregning av kontrollgrenser.


AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	11,3 %	9,2 %	12,5 %	4,6 %	9,6 %	10,0 %
95 % KI	(7,5-15,4)	(6,7-12,1)	(9,2-15,8)	(2,1-7,1)	(5,8-13,8)	(6,3-13,8)


BETANIEN HOSPITAL SKIEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	2,5 %	3,3 %	4,2 %	5,4 %	3,8 %	1,8 %
95 % KI	(0,8-4,2)	(1,3-5,8)	(2,1-6,7)	(2,9-7,9)	(1,7-6,3)	(0,0-4,0)


DIAKONHJEMMET SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	17,7 %	19,6 %	15,0 %	12,9 %	13,1 %	12,5 %
95 % KI	(13,8-21,9)	(15,8-23,5)	(12,3-17,5)	(10,8-15,0)	(10,0-16,3)	(9,6-15,4)


HARALDSPASS DIAKONALE SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	8,3 %	8,3 %	8,8 %	9,6 %	9,2 %	13,8 %
95 % KI	(4,6-12,1)	(4,6-12,1)	(5,4-12,5)	(6,3-13,3)	(5,8-12,9)	(10,0-17,5)


HELGELANDSSYKEHUSET – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2017	2018	2019	2020
Estimat	22,5 %	15,8 %	18,8 %	21,3 %
95 % KI	(17,9-27,1)	(11,7-20,4)	(14,6-23,3)	(15,8-26,7)


HELGELANDSSYKEHUSET – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2017	2018	2019	2020
Estimat	12,5 %	9,6 %	5,0 %	13,8 %
95 % KI	(7,9-17,5)	(5,4-14,6)	(2,5-7,9)	(9,6-17,9)


HELSE BERGEN⁴



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	12,9 %	11,7 %	16,7 %	8,5%	10,8 %	12,8 %
95 % KI	(8,3-17,5)	(7,9-15,4)	(12,1-21,3)	(6,8-10,4)	(9,6-12,3)	(10,4-15,4)

HELSE FONNA




Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	11,3 %	17,1 %	14,6 %	18,3 %	16,7 %	12,5 %
95 % KI	(7,5-15,0)	(12,5-21,7)	(10,4-18,8)	(12,9-23,8)	(12,9-20,4)	(7,9-17,5)

⁴ Helse Bergen har økt antall undersøkte journaler fra 10 til 40 per periode fra og med 2018.


HELSE FØRDE



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	14,6 %	11,3 %	11,3 %	12,5 %	14,2 %	17,1 %
95 % KI	(10,0-19,2)	(6,7-16,3)	(7,9-15,0)	(7,9-17,5)	(9,2-19,2)	(12,1-22,5)


HELSE MØRE OG ROMSDAL



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	27,1 %	26,3 %	26,7 %	21,3 %	22,1 %	22,1 %
95 % KI	(21,7-32,5)	(20,4-31,7)	(21,7-31,7)	(17,1-25,8)	(15,8-28,8)	(15,4-29,2)


HELSE NORD-TRØNDELAG – SYKEHUSSET LEVANGER



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	5,0 %	10,8 %	13,8 %	17,1 %	21,3 %	32,1 %
95 % KI	(2,5-7,9)	(6,7-15,8)	(10,0-17,9)	(12,5-22,1)	(16,3-26,7)	(25,8-38,8)


HELSE STAVANGER



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	15,0 %	15,8 %	10,4 %	17,5 %	15,4 %	12,1 %
95 % KI	(10,4-20,0)	(11,7-20,0)	(6,3-14,6)	(12,9-22,5)	(11,7-20,0)	(8,3-15,8)


LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	16,7 %	12,9 %	11,3 %	17,5 %	14,6 %	8,8 %
95 % KI	(12,9-20,4)	(8,3-17,5)	(7,1-15,8)	(12,1-23,8)	(9,6-19,6)	(5,8-11,7)


NORDLANDSSYKEHUSET – HODE- OG BEVEGELSESKLINIKKEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	8,8 %	9,6 %	16,3 %	10,4 %	14,2 %	6,3 %
95 % KI	(5,0-12,5)	(6,3-12,9)	(11,3-21,3)	(6,7-14,6)	(10,0-18,8)	(3,8-9,2)


NORDLANDSSYKEHUSET – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	8,3 %	8,3 %	5,4 %	20,4 %	22,1 %	14,6 %
95 % KI	(5,0-12,1)	(5,4-11,3)	(3,3-7,9)	(15,8-25,4)	(17,5-26,7)	(11,3-17,9)


NORDLANDSSYKEHUSET – KVINNEKLINIKKEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	6,3 %	12,9 %	13,8 %	9,6 %	9,2 %	12,1 %
95 % KI	(3,8-8,8)	(8,8-17,1)	(9,6-17,5)	(5,4-14,2)	(5,4-13,8)	(7,9-16,3)


NORDLANDSSYKEHUSET – LOFOTEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	8,3 %	13,3 %	6,7 %	6,7 %	15,8 %	8,3 %
95 % KI	(4,6-12,5)	(8,8-17,9)	(4,2-9,6)	(3,3-10,4)	(11,7-20,0)	(4,6-12,1)


NORDLANDSSYKEHUSET – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	10,4 %	10,4 %	8,3 %	12,9 %	20,4 %	21,3 %
95 % KI	(7,1-14,2)	(7,1-14,2)	(5,0-12,1)	(7,9-18,3)	(15,8-25,0)	(16,7-25,8)


NORDLANDSSYKEHUSET – ORTOPEDISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	17,5 %	12,5 %	12,5 %	21,7 %	19,6 %	17,1 %
95 % KI	(12,1-23,3)	(8,3-17,1)	(8,3-17,5)	(17,9-25,8)	(15,0-24,2)	(12,5-21,7)


NORDLANDSSYKEHUSET – VESTERÅLEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	18,8 %	19,2 %	12,9 %	16,3 %	8,3 %	11,3 %
95 % KI	(13,3-24,2)	(14,2-24,6)	(8,3-17,9)	(12,5-20,0)	(5,0-12,1)	(7,5-15,4)


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	9,2 %	12,5 %	9,6 %	8,3 %	8,8 %	13,3 %
95 % KI	(5,8-12,9)	(9,2-15,8)	(5,8-13,3)	(4,6-12,1)	(5,4-12,6)	(9,2-17,5)


ST. OLAVS HOSPITAL



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	13,8 %	16,3 %	16,3 %	10,0 %	11,7 %	10,8 %
95 % KI	(9,6-17,9)	(11,3-21,7)	(11,7-20,8)	(5,8-15,0)	(7,5-16,3)	(6,3-15,8)


SYKEHUSET INNLANDET



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	9,6 %	10,4 %	10,4 %	8,8 %	13,8 %
95 % KI	(6,3-13,3)	(6,7-14,2)	(7,9-12,9)	(5,8-11,7)	(10,4-17,5)


SYKEHUSET I VESTFOLD – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	10,0 %	18,8 %	18,8 %	17,9 %	21,3 %	12,1 %
95 % KI	(6,7-13,8)	(14,2-23,8)	(13,3-24,6)	(13,3-23,3)	(15,8-27,1)	(8,8-15,4)


SYKEHUSET I VESTFOLD – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	16,3 %	10,4 %	7,9 %	14,2 %	12,9 %	7,9 %
95 % KI	(11,7-21,3)	(7,1-13,8)	(5,0-11,3)	(9,6-19,2)	(8,8-17,5)	(3,8-12,5)


SYKEHUSET TELEMARK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	17,1 %	12,5 %	15,8 %	9,2 %	6,7 %	7,1 %
95 % KI	(12,1-22,5)	(8,3-17,1)	(11,3-20,4)	(5,8-12,9)	(3,8-10,0)	(3,8-11,3)


SYKEHUSET ØSTFOLD



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	12,5 %	7,5 %	10,4 %	12,1 %	10,0 %	10,8 %
95 % KI	(8,8-16,3)	(4,6-10,4)	(6,7-14,2)	(8,3-16,3)	(6,3-13,8)	(6,3-15,8)


SØRLANDET SYKEHUS – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	9,6 %	11,3 %	11,7 %	10,0 %	7,1 %	12,9 %
95 % KI	(6,3-13,3)	(7,5-15,0)	(7,9-15,8)	(5,4-15,0)	(4,2-10,4)	(8,8-17,5)


SØRLANDET SYKEHUS – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	7,1 %	5,4 %	5,8 %	4,6 %	4,6 %	10,4 %
95 % KI	(4,2-10,0)	(2,5-8,8)	(2,9-9,2)	(2,1-7,5)	(1,3-8,8)	(6,7-14,2)


UNIVERSITETSSYKEHUSSET NORD-NORGE



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	16,3 %	21,7 %	13,3 %	15,0 %	13,3 %	14,2 %
95 % KI	(12,1-20,8)	(17,1-26,3)	(8,8-17,9)	(11,3-18,8)	(9,6-17,1)	(10,0-18,3)

VESTRE VIKEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estimat	19,2 %	20,4 %	19,2 %	16,3 %	18,3 %	16,3 %
95 % KI	(14,6-23,8)	(16,3-24,6)	(15,8-22,5)	(12,1-20,8)	(12,5-24,2)	(10,8-22,1)

Vedlegg 3 Detaljert beskrivelse av beregninger

Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade

For hvert GTT-team presenteres estimat for andel sykehusopphold med minst én pasientskade per år, sammen med 95 % konfidensintervall, som belyser estimatets usikkerhet.

Andel sykehusopphold med minst én pasientskade er beregnet som følger:

$$\left(\frac{\text{Totalt antall sykehusopphold med minst én skade}}{\text{Totalt antall undersøkte sykehusopphold}} \right) * 100$$

95 % konfidensintervall for årlige estimatorer er beregnet ved å trekke tilfeldig med tilbakelegging 100 000 ganger fra datasettet med antall sykehusopphold (journaler) med minst én pasientskade for et gitt år (24 observasjoner per år). Tilbakelegging innebærer at én observasjon kan trekkes flere ganger. Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for trukket datasett beregnes. Dette gir 100 000 verdier for den årlige andelen og 95 % konfidensintervall er gitt ved 2,5 og 97,5 percentiler fra disse.

Kontrollgrafer

De røde og blå linjene er usikkerhetsintervaller for referanseverdiene, og utgjør kontrollgrenser for de glattede dataene. Kontrollgrensene for en prosentandel beregnes på følgende måte⁵:

$$\bar{p} \pm z \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

Gjennomsnittsverdien for året før, \bar{p} , beregnes basert på alle journalene som var undersøkt det året. For de fleste team undersøker man 240 journaler per år (10 journaler i 24 perioder). Siden kontrollgrensene gjelder for glattede data, er $n=100$ (antall observasjoner det glidende gjennomsnittet er basert på)⁶.

(Standardavviket til gjennomsnittet for data fra en binomisk fordeling med sannsynlighet \bar{p} er $\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$).

Størrelsen z settes som oftest til 3 i beregning av kontrollgrensene. Vi har i tillegg valgt å vise kontrollgrensene basert på $z=2$ i figurene. Kontrollgrensene er begrenset til å være mellom 0 og 100⁷. De to røde linjene og de to blå linjene markerer altså henholdsvis 2 og 3 standardavvik over og under referanseverdien. For team som trekker flere enn 10 journaler per periode vil de glattede dataene være basert på flere observasjoner (f.eks. 200, om man trekker 20 journaler per periode). Dersom man øker antall journaler som undersøkes i hver periode i løpet av tidsperioden som plottes, vil kontrollgrensene i en overgangsperiode ikke være horisontale, men gradvis danne et smalere «bånd». Dette skyldes at det glidende snittet gradvis er basert på flere datapunkter. Etter 10 perioder vil grensene igjen være horisontale.

⁵ Mohammed MA, Worthington P, Woodall WH. Plotting basic control charts: tutorial notes for healthcare practitioners. *Qual Saf Health Care* 2008;17:137-145.

⁶ Vi antar her at gjennomsnittverdien, \bar{p} , gjelder for alle perioder i inneværende år, selv om de glattede dataene er basert på data fra to ulike år i starten av hvert år.

⁷ Dersom formelen over gir et negativt tall settes grensen til 0. Dersom formelen over gir et tall større enn 100 settes grensen til 100.

Vedlegg 4 Antall sykehusopphold det er trukket fra

Tabellen under viser antall sykehusopphold som de undersøkte journalene er trukket fra for 2020 og 2019, per GTT-team og totalt. Endringen mellom 2020 og 2019 er gitt i antall og prosent.

GTT-team	Antall sykehusopphold det er trukket fra		Endring i antall	Endring i prosent
	2020	2019		
Akershus universitetssykehus	47 112	49 425	-2 313	-4,7 %
Betanien Hospital Skien	895	1 112	-217	-19,5 %
Diakonhjemmet Sykehus	9 177	10 774	-1 597	-14,8 %
Finnmarkssykehuset – Kirurgisk klinikk	2 194	7 832	-2 230	-28,5 %
Finnmarkssykehuset – Medisinsk klinikk	3 408			
Haraldsplass Diakonale Sykehus	9 272	9 638	-366	-3,8 %
Helgelandssykehuset – Kirurgisk klinikk	3 358	3 803	-445	-11,7 %
Helgelandssykehuset – Medisinsk klinikk	3 729	4 211	-482	-11,4 %
Helse Bergen	56 734	63 502	-6 768	-10,7 %
Helse Fonna	15 766	16 607	-841	-5,1 %
Helse Førde	9 760	10 414	-654	-6,3 %
Helse Møre og Romsdal	23 349	31 458	-8 109	-25,8 %
Helse Nord-Trøndelag – Sykehuset Levanger	8 794	9 708	-914	-9,4 %
Helse Stavanger	30 861	31 978	-1 117	-3,5 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	8 764	10 153	-1 389	-13,7 %
Martina Hansens Hospital	1 668	2 637	-969	-36,7 %
Nordlandssykehuset – Hode- og bevegelsesklinikken	1 292	1 345	-53	-3,9 %
Nordlandssykehuset – Kirurgisk klinikk	2 714	3 205	-491	-15,3 %
Nordlandssykehuset – Kvinneklinikken	1 089	1 144	-55	-4,8 %
Nordlandssykehuset – Lofoten	2 227	2 305	-78	-3,4 %
Nordlandssykehuset – Medisinsk klinikk	3 510	3 868	-358	-9,3 %
Nordlandssykehuset – Ortopedisk klinikk	1 527	1 393	134	9,6 %
Nordlandssykehuset – Vesterålen	2 800	2 861	-61	-2,1 %
Oslo universitetssykehus	65 383	73 364	-7 981	-10,9 %
St. Olavs hospital	42 050	44 266	-2 216	-5,0 %
Sykehuset Innlandet	35 712	39 353	-3 641	-9,3 %
Sykehuset i Vestfold – Kirurgisk klinikk	12 395	13 104	-709	-5,4 %
Sykehuset i Vestfold – Medisinsk klinikk	14 023	14 708	-685	-4,7 %
Sykehuset Telemark	18 654	15 395	3 259	21,2 %
Sykehuset Østfold	28 153	29 866	-1 713	-5,7 %
Sørlandet sykehus – Kirurgisk klinikk	14 250	14 622	-372	-2,5 %
Sørlandet sykehus – Medisinsk klinikk	13 082	14 589	-1 507	-10,3 %
Universitetssykehuset Nord-Norge	26 043	28 937	-2 894	-10,0 %
Vestre Viken	43 483	48 650	-5 167	-10,6 %
TOTALT	563 228	616 227	-52 999	-8,6 %