

## Kontrollrutiner for pasientar behandla kirurgisk for UTUC.

Risikogrupper for pasientar behandla med NU for UTUC. Sidan vi ikkje har så mange av desse pasientane gjer vi det så enkelt som mulig.

**Høgrisiko**gruppe: T2+ eller N+ ved endelig histologi etter NU/ureterreseksjon

**Lågrisiko**gruppe: Ta/T1 ved endelig histologi etter NU/ureterreseksjon

Angående CT som rutineundersøkelse:

Vurder om eit evt positivt funn vil ha konsekvens for pasienten. I praksis vil dette gjelde for pasientar <80 år med ECOG 0-1.

### **Kontroll høgrisiko : T2 eller meir ved endelig histologi etter NU/Ureterreseksjon**

Undersøkelse	6 uker	4 mndr	8 mndr	12 mnd	18 mnd	24 mnd	30 mnd	36 mnd	42 mnd	48 mnd	60 mnd
Bloodprøver som nyreca. Ktr	x	x	x	x	x	x	x*	x	x	x	x
Cystoskopi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CT Thorax + Abdomen		x	x	x	x	x	x	x			x

### **Kontroll lågrisiko : Ta/T1 ved endelig histologi etter NU/Ureterreseksjon**

Undersøkelse	6 uker	4 mndr	8 mndr	12 mnd	18 mnd	24 mnd	30 mnd	36 mnd	42 mnd	48 mnd	60 mnd
Bloodprøver som nyreca. Ktr	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cystoskopi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CT Thorax + Abdomen			x								x

### **Kontroll etter endoskopisk behandling for UTUC. Ved residiv rykker pasienten tilbake til start.**

Undersøkelse	3 mnd	6 mnd	9 mnd	12 mnd	18 mnd	24 mnd	36 mnd	48 mnd	60 mnd
URS	x	x		x		x			
Cystoskopi			x		x				
CT urografi og CT thorax			x		x		x	x	x