

5.2.3 Evidensprofil Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2

Behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes

Pasientpreferanser for medikament behandling (ikke-insulin) hos personer med diabetes type 2

Utfall	Relativ effekt (KI) [deltakere, studier, oppfølging]	Oppsummering av tiltak	Tiltro til estimatene
Pasientpreferanser	Basert på data fra 4 421 deltakere i 10 tverrsnittstudier	Resultater fra kvalitativ analyse viste at de tre følgende grupperingene ble hyppigst brukt for å vurdere pasient preferanser ved medikament behandling: 1) Fordeler ved behandling (hovedsakelig glykemisk kontroll, vektkontroll); 2) Ulemper ved behandling (hovedsakelig administrering, hyppighet, kostnad); og 3) Bivirkninger (hovedsakelig vektøkning, GI-effekter, hypoglykemi) Ved relativ vurdering av de tre grupperingene, så ble fordeler ved medikament behandling (ved glykemisk kontroll og vektkontroll) ansett som den viktigste preferansen blant pasientene, fremfor faktorer knyttet til ulemper- og bivirkninger ved medikament behandling	Veldig lav Risiko for publiseringsskjevhet