

## Buprenorfin sammenliknet med metadon for gravide i LAR (RCTer)

Utfall	Antall deltakere (studier)	Relativ effekt (95 % KI)	Forventete absolutte effekter (95 % KI)			Tillit til effektestimatet (forskjellen)
			Metadon	Buprenorfin	Forskjell	
Fosterdød	18 (1 RCT)	<b>RR 0,33</b> (0,02 til 7,24)	<b>11 %</b>	<b>4 %</b> (0 til 80)	<b>7 % færre</b> (11 færre til 69 flere)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,def
For tidlig fødsel	151 (2 RCTer)	<b>RR 0,36</b> (0,13 til 0,99)	<b>18 %</b>	<b>6 %</b> (2 til 18)	<b>11 % færre</b> (16 til 0 færre)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,e
Gestasjonsalder	113 (3 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>39 uker</b>	Gjennomsnitt: <b>39 uker</b>	<b>0 uker mer</b> (0 til 1 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,e
Vekt	165 (3 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>2881 gram</b>	Gjennomsnitt: <b>3128 gram</b>	<b>273 gram mer</b> (104 til 441 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,e
Lengde	165 (3 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>48 cm</b>	Gjennomsnitt: <b>50 cm</b>	<b>2 cm mer</b> (1 til 3 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,e
Hodeomkrets	165 (3 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>33 cm</b>	Gjennomsnitt: <b>34 cm</b>	<b>1cm mer</b> (0 til 2 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,e
Sykehusopphold	152 (2 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>16 dager</b>	Gjennomsnitt: <b>10 dager</b>	<b>4 dager mindre</b> (10 mindre til 2 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,d,e,g
Neonatalt abstinenssyndrom (NAS)	166 (3 RCTer)	<b>RR 0,84</b> (0,61 til 1,15)	<b>54 %</b>	<b>46 %</b> (33 til 63)	<b>9 % færre</b> (21 færre til 8 flere)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,de
NAS-behandlingsvarighet	139 (2 RCTer)	-	Gjennomsnitt: <b>10 dager</b>	Gjennomsnitt: <b>4 dager</b>	<b>3 dager mindre</b> (8 mindre til 2 mer)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,d,e,g
Opiatbruk (urin)	131 (1 RCT)	<b>RR 1,89</b> (0,56 til 6,38)	<b>6 %</b>	<b>10 %</b> (3 til 35)	<b>5 % flere</b> (2 færre til 30 flere)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,d,e,f,g
Benzodiazepinbruk (urin)	131 (1 RCT)	<b>RR 3,78</b> (0,40 til 35,35)	<b>1 %</b>	<b>5 %</b> (1 til 48)	<b>4 % flere</b> (1 færre til 47 flere)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,d,ef,g
Kokainbruk (urin)	131 (1 RCT)	<b>RR 1,57</b> (0,44 til 5,60)	<b>6 %</b>	<b>9 %</b> (2 til 31)	<b>3 % flere</b> (3 færre til 25 flere)	⊕○○○ SVÆRT LAV a,b,c,d,e,f,g

### Forklaringer

- Selektert utvalg
- Frafallsskjøvheter
- Kortere eksponeringstid og mindre tett oppfølging enn i Norge.
- Konfidensintervall omfatter både økt og redusert risiko.
- Uklar randomiseringsprosedyre
- Kun én studie
- Statistisk heterogenitet ( $I^2 > 75\%$ )