

Effekter av å anbefale og tilrettelegge for bruk av prevensjon (Heil et al., 2016)

Studie: Heil et al., 2016

Populasjon: Opioidavhengige kvinner

Land: Vermont, Australia

Intervensjon: anbefaling om og tilrettelegging for bruk av prevensjon

Sammenligning: ikke anbefaling eller tilrettelegging

| Funn: Effekter av å anbefale og tilrettelegge for å bruke prevensjon | GRADE (vurdering av tillit) |
|--|------------------------------------|
| BRUK AV PREVENSJON (oppfølging ved 6 mnd) | |
| Med veiledning og tilbud om langtidsvirkende reversibel prevensjon, bruker 15 av 16 i tiltaksgruppen prevensjon ved 6 mnd oppfølging, mens kun 2 av 15 i kontrollgruppen bruker tilsvarende. | ⊕○○○ Svært lav ^{1,2,3} |
| GRAVIDITET (oppfølging ved 6 mnd) | |
| Med veiledning og tilbud om langtidsvirkende reversibel prevensjon var ingen i tiltaksgruppen gravide ved 6 mnd oppfølging, mens 3 av 15 i kontrollgruppen var gravide. | ⊕○○○ Svært lav ^{1,2,3} |

1. De fem første kvinnene ble inkludert i tiltaksgruppen; de neste 26 ble tilfeldig fordelt (randomisert) til tiltaksgruppe og kontrollgruppe.
2. Studien har stor risiko for skjevheter fordi randomisering var ikke fullstendig og ikke beskrevet, allokering er ikke beskrevet, det var ingen blinding, og deltakerne i tiltaket fikk økonomisk kompensasjon for oppmøte på oppfølgingsavtaler.
3. Svært lavt antall deltakere (N) og bredt konfidensintervall (KI).