


Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag

Spørsmål 3.7: Hva er effekten av CIMT i tidlig og sen fase (> 3 mnd) hos pasienter med hjerneslag?

P	Slagpasienter i tidlig og sen fase (> 3 mnd) med nedsatt armfunksjon	
I	Constrained -Induces Movement Therapy	Dato for søk: 8-10.03.2016
C	Annen spesifikk eller standard eller ingen (i sen fase) trening for parese i overekstremitet	Søk oppdatert dato:
O	Armfunksjon, ADL-funksjon	Bibliotek: Helsedirektoratet



*To referanser gikk videre etter vurdering av tittel og sammendrag. En av dem var kun tilgjengelig på Portugisisk og ble derfor ikke vurdert ved fulltekst.

Tabell 1a. Inkluderte systematiske oversikter (oversiktsartikler).

Forfatter, år	Tittel	Siste litteratursøk
Corbetta, Sirtori, Castellini, Moja, & Gatti, 2015	Constraint-induced movement therapy for upper extremities in people with stroke.	Juli 2015

Fullstendig referanseliste (inkluderte referanser).

Corbetta, D., Sirtori, V., Castellini, G., Moja, L., & Gatti, R. (2015). Constraint-induced movement therapy for upper extremities in people with stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10, CD004433. doi:<http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004433.pub3>