

Summary of findings (SoF) tabell

Resultat-tabell som viser kvaliteten på dokumentasjonen på tvers av utfallsmål

PICO-spørsmål 3.1: Hva er effekten av tidlig støttet utskrivning hos slagpasienter sammenlignet med standard oppfølging/behandling?

Kilde: *Services for reducing duration of hospital care for acute stroke patients (Review) Fearon P, Langhorne P, Early Supported Discharge Trialists, The Cochrane Library 2012, Issue 9*

Utfall	Relativ effekt (KI) [deltakere, studier, oppfølging]	Absolutt forskjell med		Tiltro til estimatene
		[kontroll]	[intervensjon]	
Død	<p>OR 0.91 (KI 0.67, 1.25)</p> <p>Basert på data fra 1 957 deltagere i 14 RCT-studier over 3 – 12 måneder</p>	<p>91 per 1000</p> <p>Forskjell i risiko med intervensjon:</p>	<p>83 per 1000</p> <p>8 færre per 1000 (KI 30 færre til 23 fler)</p>	<p>Moderat Upresist effektestimert</p> <p>⊕⊕⊕○</p>
Død eller fysisk avhengighet ¹	<p>OR 0.80 (KI 0.67, 0.97)</p> <p>Basert på data fra 1 957 deltagere i 14 RCT-studier over 3 – 12 måneder</p>	<p>470 per 1000</p> <p>Forskjell i risiko med intervensjon:</p>	<p>415 per 1000</p> <p>55 færre per 1000 (KI 8 færre til 97 færre)</p>	<p>Høy</p> <p>⊕⊕⊕⊕</p>
Død eller behov for behandling ved institusjon	<p>OR 0.78 (KI 0.61, 1.00)</p> <p>Basert på data fra 1 758 deltagere i 12 RCT-studier over 3 – 12 måneder</p>	<p>211 per 1000</p>	<p>173 per 1000</p>	<p>Høy</p> <p>⊕⊕⊕⊕</p>

		Forskjell i risiko med intervensjon:	38 færre per 1000 (KI 71 færre til 0 færre)	
Activities of daily living (Barthel ADL)²	Basert på data fra 1 124 deltakere i 9 RCT-studier over 3 – 12 måneder	Forskjell i risiko med intervensjon:	SMD³ 0.03 høyere (KI 0.08 lavere til 0.15 høyere)	Høy ⊕⊕⊕⊕
Helseøkonomisk effekt - lengde på sykehusopphold (antall dager)	Basert på data fra 1 695 deltakere i 13 RCT-studier over 3 – 12 måneder	Forskjell i risiko med intervensjon:	MD⁴ 7.10 lavere (KI 10.03 lavere til 4.17 lavere)	Moderat Uforklarlig heterogenitet mellom studier ⊕⊕⊕○
Helseøkonomisk effekt – antall reinnleggelser	OR 1.26 (KI 0.94, 1.67) Basert på data fra 918 deltakere i 7 RCT-studier over 3 – 12 måneder	286 per 1000	335 per 1000 49 fler per 1000 (KI 12 færre til 115 fler)	Moderat Upresist effektestimat ⊕⊕⊕○

¹ Fysisk avhengighet ble definert som: avhengig av hjelp til forflytning, mobilitet, vasking/stell, påkledning eller toalettbesøk (basic ADL)

² ADL – Activity in Daily Life. Barthel indeks gir uttrykk for hvor mye hjelp man trenger for å utføre hverdagsaktiviteter.

³ SMD – Standard Mean Difference – er en gjennomsnittlig forskjell som benyttes når det er brukt ulike måleteknikker for samme endepunkt, i dette tilfellet ADL.

⁴ MD – Mean Difference - er en gjennomsnittlig forskjell.