Utfall Tidsramme	**Resultater og målinger fra studier**	**Estimert effekt i aktuell populasjon** Placebo Kolinesterasehemmer	**Tiltro til estimert intervensjonseffekt** (kvalitet på dokumentasjonen)	**Konklusjon**
ADL 12 måneder	Målt med: ADSC-ADL Skala: 0-54 Høyere bedre Basert på data fra 36 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 12 måneder	% % Forskjell: **MD 7.0 høyere** (CI 95% 7.55 lavere - 21.55 høyere)	**Veldig lav** grunnet alvorlig/signifikant risk of bias, grunnet veldig alvorlig upresise estimater (imprecision)[1]	Vi er svært usikre på om kolinesterasehemmer forbedrer ADL-funksjon.
Kognisjon	Basert på data fra 36 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid inntil 12 måneder	Det ble ikke funnet statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene på kognitive effektmål slik som MMSE, Mattis Dementia Rating Scale, og heller ikke på Frontal Assessment Battery eller Neuropsychiatric Inventory. På grunn av få inkluderte pasienter er resultatene svært upresise.	**Veldig lav** grunnet veldig alvorlig upresise estimater (imprecision), grunnet alvorlig/signifikant risk of bias[2]	Vi er svært usikre på om kolinesterasehemmer forbedrer kognisjon.
Bivirkninger 1 år	Basert på data fra 39 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 12 måneder	Bivirkningsprofilen ser ut til å være omtrent den samme som ved bruk av kolinesterasehemmere for andre tilstander, dvs klart forhøyet risiko for gastrointestinale bivrikninger som for eksempel oppkast.	**Veldig lav** grunnet alvorlig/signifikant manglende overførbarhet (indirectness), grunnet veldig alvorlig upresise estimater (imprecision)[3]	Kolinesterasehemmere øker trolig risiko for bivirkninger.

1. **Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig.** Ufullstendig rapportering av utfall og/eller stort frafall, Selektiv rapportering av utfall; **Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig.** Data fra kun en studie, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene, Bredt konfidensinterval;
2. **Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig.** Usikkerhet rundt ufullstendig rapportering av utfall og/eller stort frafall; **Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig.** Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene, Data fra kun en studie;
3. **Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig.** Konklusjon støtter seg på indirekte evidens; **Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig.** Data fra kun en studie, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene;