

Utfall Tidsramme	Resultater og målinger fra studier	Estimert effekt i aktuell populasjon  Placebo                  SSRI	Tiltro til estimert intervensjonseffekt  (kvalitet på dokumentasjonen)	Konklusjon
Reduksjon i depressive symptomer  Gjennomsnitt 21,3 uker	Målt med: Hamilton Depression Scale (1 RCT) og Cornell Scale for Depression in Dementia (4 RCT)  Skala: - Lavere bedre  Basert på data fra 375 pasienter i 5 studier  Oppfølgingstid Gjennomsnittlig 21.3	gj.snitt/ mean          gj.snitt/ mean  Forskjell: <b>SMD 0.1 lavere</b>  (CI 95% 0.34 lavere - 0.13 høyere)	<b>Lav</b>  grunnet alvorlig/signifikant upresise estimer (imprecision), grunnet alvorlig/signifikant manglende overførbarhet (indirectness) <sup>1</sup>	SSRI utgjør mulig en liten eller ingen forskjell på reduksjon i depressive symptomer.

1. **Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig.** Heterogen gruppe pasienter med ulik grad av depresjon (mild-alvorlig); **Upresise estimer (imprecision): Alvorlig.** Bredt konfidensintervall, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene.