

Utfall Tidsramme	Resultater og målinger fra studier	Estimert effekt i aktuell populasjon		Tiltro til estimert intervensjonseffekt (kvalitet på dokumentasjonen)	Konklusjon
Endring i total nattesøvn (min) 2 uker	Målt med: Aktigrafi Skala: - Høyere bedre Basert på data fra 30 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 2 uker	Placebo mingj.snitt/ mean	trazodon (50 mg) mingj.snitt/ mean Forskjell: MD 42.46 høyere (CI 95% 0.9 høyere - 84.0 høyere)	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ¹	Trazodon (50 mg) gir muligens bedre total nattesøvn (målt i min).
Søvn effektivitet (%) 2 uker	Målt med: Aktigrafi Skala: - Høyere bedre Basert på data fra 30 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 2 uker	%gj.snitt/ mean	%gj.snitt/ mean Forskjell: MD 8.53 høyere (CI 95% 1.9 høyere - 15.3 høyere)	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ²	Trazodon (50 mg) kan muligens bedre søvn effektivitet (%).
Endring i innsøvingstid (min) 2 uker	Målt med: Aktigrafi Skala: - Lavere bedre Basert på data fra 30 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 2 uker	mingj.snitt/ mean	mingj.snitt/ mean Forskjell: MD 20.41 lavere (CI 95% 60.4 lavere - 19.6 høyere)	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ³	Det er usikkert hvorvidt trazodon (50 mg) har effekt på innsøvingstid.
Endring i søvn på dagtid (min) 2 uker	Målt med: Aktigrafi Skala: - Lavere bedre Basert på data fra 30 pasienter i 1 studier Oppfølgingstid 2 uker	mingj.snitt/ mean	mingj.snitt/ mean Forskjell: MD 5.12 høyere (CI 95% 28.2 lavere - 38.4 høyere)	Lav grunnet veldig alvorlig upresise estimer (imprecision) ⁴	Det er usikkert hvorvidt trazodon (50 mg) reduserer eller øker søvn på dagtid.

1-4 Upresise estimer (imprecision): Svært alvorlig. Bredt konfidensintervall, Få pasienter (<100)/(100-300) inkludert i studiene, Data fra kun en studie;