


Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Problemstilling 1

Bør pasienter med selvmordsatferd (tanker, planer, handlinger) observeres kontinuerlig eller ved intervallobservasjon når de er innlagt i døgnavdelinger?

P	Pasienter (i selvmordsrisiko) i døgnavdelinger i psykisk helsevern eller TSB	
I	Kontinuerlig observasjon	Dato for søk: 30.7.2020
C	Intervallobservasjon	Søk oppdatert dato: 8.12.2023
O	Selv mord Selvmordsforsøk Pasientens opplevelse	



Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkel.

Forfatter, år	Kommentar/begrunnelse for eksklusjon
Ngune I, Myers H, Cole A, Palamara P, Redknap R, Roche M, Twigg D. Developing nurse-sensitive outcomes in acute inpatient mental health settings-A systematic review. J Clin Nurs 2023;32(17-18):6254-67	Besvarer ikke PICO
Reen, G. K., Bailey, J. Maughan, D.L., Vincent, C. (2020) Systematic review of interventions to improve constant observation on adult inpatient psychiatric wards. 2020. International Journal of Mental Health Nursing (29), 372-386.	Var inkludert i søket fra 2020 og er benyttet i retningslinjen
Tan YJ, Khoo SQ, Tan ST. Acute metaldehyde poisoning from ingestion: clinical features and implications for early treatment. Acute Med Surg 2022;9(1):e766.	Besvarer ikke PICO