


Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Problemstilling:

Reduseres risikoen for selvmord hos pasienter som har en sikkerhetsplan utarbeidet i samarbeid med behandler i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

P	Pasienter i psykisk helsevern og TSB	
I	Sikkerhetsplan	Dato for søk: 17. og 18.12.2020
C	Ingen sikkerhetsplan	Søk oppdatert dato:
O	Selvmord Selvmordsforsøk Selvmordstanker eller -planer	



Figur 1. Flytskjema over identifiserte treff og utvelgelse av relevante referanser.

Tabell 1a. Inkluderte systematiske oversikter (oversiktsartikler)

Forfatter, år, tittel	Metodisk kvalitet*	Egne kommentarer
Stanley B, Brown GK, Brenner LA, Galfalvy HC, Currier GW, Knox KL, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry 2018;75(9):894-900.	Middels/moderat	Stor cohort studie, ingen randomisering, kontroller retrospektivt identifisert.

* Vurdert med FHI/Kunnskapssenterets sjekkliste for cohort studier

Tabell 2. Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkelen.

Forfatter, år	Kommentar/begrunnelse for eksklusjon
Bryan CJ, May AM, Rozek DC, Williams SR, Clemans TA, Mintz J, et al. Use of crisis management interventions among suicidal patients: Results of a randomized controlled trial. Depress Anxiety 2018;35(7):619-28.	Besvarer ikke I.
Moscardini EH, Hill RM, Dodd CG, Do C, Kaplow JB, Tucker RP. Suicide Safety Planning: Clinician Training, Comfort, and Safety Plan Utilization. International Journal of Environmental Research & Public Health [Electronic Resource] 2020;17(18):04.	Web-oppfølging av 117 deltakere, erfaringer med trening og bruk av sikkerhetsplan. Besvarer ikke utfallene i PICO..
Zonana J, Simberlund J, Christos P. The Impact of Safety Plans in an Outpatient Clinic. Crisis: Journal of Crisis Intervention & Suicide 2018;39(4):304-9.	Suicidalforsøk hos pasienter før og etter innføring av sikkerhetsplan. Liten retrospektiv primærstudie (n=48).

Fullstendig referanseliste (inkluderte og ekskluderte referanser)

Bryan CJ, May AM, Rozek DC, Williams SR, Clemans TA, Mintz J, et al. Use of crisis management interventions among suicidal patients: Results of a randomized controlled trial. Depress Anxiety 2018;35(7):619-28.

Moscardini EH, Hill RM, Dodd CG, Do C, Kaplow JB, Tucker RP. Suicide Safety Planning: Clinician Training, Comfort, and Safety Plan Utilization. International Journal of Environmental Research & Public Health [Electronic Resource] 2020;17(18):04.

Stanley B, Brown GK, Brenner LA, Galfalvy HC, Currier GW, Knox KL, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention With Follow-up vs Usual Care of Suicidal Patients Treated in the Emergency Department. JAMA Psychiatry 2018;75(9):894-900.

Zonana J, Simberlund J, Christos P. The Impact of Safety Plans in an Outpatient Clinic. Crisis: Journal of Crisis Intervention & Suicide 2018;39(4):304-9.