


## Dokumentasjonsark: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

### Problemstilling 2

Reduserer intervallobservasjon selvmord og selvmordsforsøk sammenlignet med ordinær behandling i døgnavdeling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

<b>P</b>	Pasienter i døgnavdelinger i psykisk helsevern eller TSB	
<b>I</b>	Intervallobservasjon	Dato for søk: 28.5.2021
<b>C</b>	Ordinær døgnavdeling (uten egen observasjonsstatus)	Søk oppdatert dato: 15.12.2023
<b>O</b>	Selv mord Selvmordsforsøk Pasientens opplevelse	



**Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkel.**

<b>Forfatter, år</b>	<b>Kommentar/begrunnelse for eksklusjon</b>
Laukkanen, E., Kuosmanen, L., Louheranta, O., Vehvilainen-Julkunen, K. Psychiatric nursing managers' attitudes towards containment methods in psychiatric inpatient care. Journal of Nursing Management. Vol.28,(3), 2020, pp. 699-709.	Svarer ikke på PICO
Veale D, Ali S, Papageorgiou A, Gournay K. The psychiatric ward environment and nursing observations at night: A qualitative study. J Psychiatr Ment Health Nurs 2020;27(4):342-51.	Inkludert i søk fra 2021, og benyttet i retningslinjen