

«Den gode undersøkelsen» med aldersrelatert sjekkliste for barn 0-20 år

Alder (år)	1 2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-20
Milepæler i tannutvikling og erupsjon	Erupsjon: primære tenner		Erupsjon: 1. molar og incisiver. Mineraliseringsforstyrrelser MIH Tappform lateral			Erupsjon: incisiver Erupsjonsrekkefølge/symmetri Morfologiske avvik Mineraliseringsforstyrrelser		Erupsjon: hjørnetenner, premolarer og 2. molar Erupsjonsrekkefølge/symmetri Morfologiske avvik Mineraliseringsforstyrrelser			Erupsjon: 2. molar			Erupsjon: 3. molar
Okklusjonsutvikling	Sugevaner		Sugevaner, kryssbitt og -inverterte incisiver Erupsjonsproblem Tidlige traumer Overtallige tenner Ektopisk erupsjon 1. molar (2-4%)			Kryssbitt, inverterte incisiver Store overbitt - traumerisiko Dentoalveolære underbitt Sekundær retensjon /ankylose - agenesier Palpere hjørnetenner Diastema mediale, leppebånd Vurdere behov for interseptiv ortodontisk behandling		Palpere hjørnetenner i overkjeven - vurdere radiologisk undersøkelse Sekundær retensjon/ankylose - agenesier Over- og underbitt Åpne- og dype bitt Kryss- og saksebitt Trangstillinger Vurdere behov for kjeveortopedi			Erupsjonsproblem av 2. molar Vurdere behov for kjeveortopedi - Henvise alle bittavvik med behov			Observere kjevevekst Basale underbitt, -overbitt, åpne- og dype bitt Ansikts asymmetrier Multiple agenesier, traumer tanntap (evt. kjeveortopedisk forbehandling til protetiske løsninger)
Den gode undersøkelsen	Samtale med foreldre: kartlegge - så målrettet informasjon Tannhelsevaner (tannpuss, fluorbruk, kosthold, godteri - mellommåltider, brus mm) Medisinsk, odontologisk og sosial anamnese Klinisk undersøkelse (fra 3 år) <ul style="list-style-type: none"> Ekstraoral Omsorgssvikt, overgrep, mishandling Tenner, gingiva og slimhinne Bittforhold, tannerupsjon, okklusjonsutvikling Vurdere behov for røntgen Kariesrisikovurdering – bestem undersøkelsesintervall Behov for fissurforsegling? 					Som for 1-7 år. <i>I tillegg:</i> <ul style="list-style-type: none"> Vurdere ev. agenesier Behov for fissurforsegling? 		Som for 2-9 år. <i>I tillegg:</i> <ul style="list-style-type: none"> Periodontal undersøkelse*, vurder BW og evt. lomme Erosjoner og tannslitasje 		Som for 2-12 år		Som for 2-15 år <i>I tillegg:</i> <ul style="list-style-type: none"> Periodontal undersøkelse*, vurder BW og evt. lomme Multiple Agenesier. Andre med tverrfaglige og/eller protetiske behov; f. eks mineraliseringsforstyrrelser Traumer med behov for endelige restaureringer 		

Periodontal undersøkelse*:

- Ved statusundersøkelse 12, 15 og 20 år: Hvis bentap ses på BW utføres lommebydemåling.
- Ved funn av en eller flere 5 mm tannkjøttlommer (gjelder ikke om det er såkalte pseudolommer), registreres en fullstendig 4- eller 6-punkts lommestatus inklusiv blødning ved sondering. Behandlingsplan utarbeides.
- Røntgen kompletteres ved indikasjon.
- Vurder henvisning til spesialist.