

Informasjon til rekvirenter om Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) og tilgjengelighet og råd for bruk i Norge

- Paxlovid tabletter (nirmatrelvir/ritonavir) er et antiviralt legemiddel mot covid-19 tilgjengelig i Norge fra 8. desember 2022.
- Nasjonalt faglig råd for bruk av Paxlovid er publisert i [Helsedirektoratets veileder for legemiddelbehandling av covid-19](#). Legemiddelet er tilgjengelig i begrenset mengde og prioriteres for pasienter med høyest forventet nytte.
- Helsedirektoratet ber rekvirenter gjøre seg kjent med rådet for bruk.
- Vær spesielt oppmerksom på interaksjonsproblematikken med mange vanlige legemidler og behov for dosejustering ved nyresvikt.
- Til pasienter utenfor institusjon med bekreftet covid-19 og som omfattes av indikasjon beskrevet i det faglige rådet kan lege rekvirere Paxlovid på blå resept etter blåreseptforskriften § 4.
- Paxlovid kan rekvireres til pasienter på kommunal institusjon med bekreftet covid-19 og som omfattes av indikasjon beskrevet i det faglige rådet.
- På grunn av begrenset tilgang til legemidlet kan ikke apotek utlevere Paxlovid til rekvirentens eget bruk, på hvit resept eller etter rekvisisjon til legekantor eller andre institusjoner enn sykehjem og kommunale akutte døgnenheter (KAD-enheter).

Regjeringen har besluttet å gå til innkjøp av Paxlovid til behandling av pasienter med covid-19. Paxlovid fikk betinget markedsføringstillatelse (MT) av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) 28. januar 2022 og har norsk MT.

Paxlovid vil være tilgjengelig i apotek fra 8. desember 2022.

Nasjonalt faglig råd for bruk av Paxlovid

Informasjon og faglige anbefalinger om bruk av Paxlovid er publisert i Helsedirektoratets veileder for legemiddelbehandling av covid-19. Legemiddelet er tilgjengelig i begrenset mengde og prioriteres for pasienter med høyest forventet nytte.

Se [Helsedirektoratets koronaveileder for oppdatert informasjon](#).

Helsedirektoratet ber rekvirenter om å gjøre seg kjent med rådene for bruk. Paxlovid anbefales kun brukt til voksne med bekreftet SARS-CoV-2 smitte og høy risiko for å utvikle alvorlig covid-19. Behandlingen bør ikke gis til pasienter som på grunn av covid-19 har behov for supplerende oksygen. Helsedirektoratets anbefaling gir en veiledning i helhetsvurdering av risiko. For alvorlig immunsvekkede pasienter bør spesialist på grunnsykdommen konfereres for å vurdere risiko for alvorlig covid-19.

På grunn av **interaksjonsproblematikk mellom ritonavir og mange vanlige legemidler** gjør vi spesielt oppmerksom på at det må gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk.

Paxlovid bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og dosejustering bør vurderes ved moderat nedsatt nyrefunksjon.

Se [preparatomtalen](#) for Paxlovid for informasjon om dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger mm.

Rekvirering

Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Lege kan rekvirere Paxlovid på blå resept til den enkelte pasient utenfor institusjon etter blåreseptforskriften § 4. Alle som oppholder seg i Norge har rettigheter etter blåreseptforskriften § 4, uavhengig av medlemskap i folketrygden. Etter endring i blåreseptforskrift § 4 punkt 2, gis det kun stønad til antiinfektiva til forebygging eller behandling av covid-19 i henhold til faglige råd fra Helsedirektoratet.

Paxlovid kan utleveres fra apotek til kommunal institusjon (sykehjem og KAD-enheter), eller private sykehjem med kommunal avtale etter rekvisisjon. Slike institusjoner kan faktureres apotekets arbeidspris som er kr 153 eks mva/ 191,25 inkludert mva per pakning. Det kan kun rekvireres til pasienter med bekreftet covid-19 og som omfattes av de faglige rådene. KAD-enheter kan dessuten rekvirere inntil 5 pakninger Paxlovid til lager. Det presiseres at legemiddelet skal være kostnadsfritt for pasienten.

Det er begrenset tilgang på Paxlovid i Norge og Legemiddelverket har fattet [vedtak om rasjonering](#) med hjemmel i [Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 - Lovdata](#). Apotek **kan ikke** utlevere Paxlovid til rekvirentens eget bruk, på hvit resept eller etter rekvisisjon til legekontor eller andre institusjoner enn sykehjem og KAD-enheter. Disse begrensningene er vedtatt for å sikre riktig bruk av Paxlovid og forebygge en mangelsituasjon [Parallell eksport, meldeplikt og rasjonering i forbindelse med COVID-19 - Legemiddelverket](#)

Pasienter bør informeres om smittevern hensyn dersom de selv må oppsøke apotek for utlevering.

Spørsmål om tilgang på Paxlovid kan sendes til legemiddelberedskap@helsedir.no

Helsedirektoratets veileder for legemiddelbehandling av covid-19:

<https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevern-utstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19>

Preparatomtale for Paxlovid: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_no.pdf

Vedtatt om rasjonering av Paxlovid tabletter: <https://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-paxlovid-tabletter>

Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-06-22-1109?q=covid-19%20legemidler>

Legemiddelverkets vedtak om parallell eksport, meldeplikt og rasjonering i forbindelse med covid-19: <https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallell-eksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19>